

神奈川県
野菜優良種導入指針

令和4年3月

神奈川県

目 次

ページ

ページ

I 根 菜 類

1. ダイコン …………… 1
2. 赤ダイコン・ミニダイコン・辛味ダイコン …… 2
3. コカブ …………… 2
4. ゴボウ …………… 3
5. ニンジン …………… 3
6. ショウガ …………… 4

II 葉茎菜類

1. キヤベツ …………… 5
2. ハクサイ …………… 7
3. ホウレンソウ …………… 8
4. 根深ネギ …………… 9
5. 葉ネギ …………… 10
6. 株ネギ …………… 10
7. タマネギ …………… 11
8. ラッキョウ …………… 11
9. ニンニク …………… 12
10. 葉ニンニク …………… 12
11. ニラ …………… 12
12. シュンギク …………… 13
13. ミツバ …………… 13
14. コマツナ …………… 13
15. ツケナ類 …………… 14
16. カラシナ・タカナ類 …………… 15
17. ミズナ …………… 15
18. ナバナ …………… 15
19. チンゲンサイ …………… 16
20. タアサイ …………… 16
21. 葉ダイコン …………… 17
22. エンサイ …………… 17
23. カイラン …………… 17
24. モロヘイヤ …………… 17

III 洋 菜 類

1. レタス …………… 18
2. リーフレタス …………… 18
3. コスレタス・その他レタス類 …………… 19
4. 茎レタス …………… 19
5. カリフラワー …………… 19
6. カリフラワー有色種・ロマネスコ …… 19
7. ブロッコリー …………… 20
8. パセリ …………… 21
9. セルリー …………… 21
10. アスパラガス …………… 21

11. リーキ …………… 21
12. ルッコラ (ロケットサラダ) …………… 21

IV 果 菜 類

1. キュウリ …………… 22
2. キュウリ台本 …………… 23
3. トマト …………… 23
4. ミニトマト・中玉トマト …………… 24
5. 生食・加熱調理兼用トマト …………… 24
6. 調理用トマト …………… 26
7. トマト台木 …………… 26
8. ナス …………… 27
9. ナス台木 …………… 27
10. ピーマン …………… 27
11. カラーピーマン (パプリカ) …………… 27
12. カボチャ …………… 28
13. トウガン …………… 28
14. オクラ …………… 28
15. シシトウ …………… 28
16. ズッキーニ …………… 29
17. スイートコーン …………… 29
18. ニガウリ …………… 30

V 果実的野菜

1. イチゴ …………… 31
2. スイカ …………… 31
3. スイカ用台木 …………… 32
4. メロン …………… 32

VI 豆 類

1. エンドウ …………… 33
2. インゲンマメ …………… 33
3. エダマメ …………… 34
4. ソラマメ …………… 34
5. ラッカセイ …………… 35

VII いも類

1. サツマイモ …………… 36
2. ジャガイモ …………… 36
3. サトイモ …………… 37

VIII 工芸作物

1. コンニャク …………… 37

I 根 菜 類

1 ダイコン

(1) 冬まきトンネル[12月下～2月下まき・3月下～5月上どり]

品 種 名	種 苗 会社名	特 性 一 覧								備 考
		早晩性	首色	抽根性	抽だい性	耐寒性	根 形	ウイルス		
貴 誉	みかど	中生	緑	中	晩	中	総太	強	12月中～1月下旬まき、4～5月上旬どりに適する。	
つ や 風	タキイ	中生	緑	中	極晩	中	総太	中	色ツヤ良い、2月上旬まき4月どりに適する。	
天 宝	サカタ	晩生	緑	中	晩	中	総太	中	12月まき、4～5月どりに適する。	
春 慶	ナント	晩生	緑	小(5cm)	晩	強	総太	強	11月上～下旬まき、3～4月どりに適する。	
はる 春	うたげ 宴	雪印	中生	淡緑	中	極晩	強	総太	-	12月中旬～2月中旬まき、4月中旬～5月中旬どりに適する(県北)。
晩 抽 直 春	カネコ	カネコ	中生	緑	中	極晩	強	総太	-	1月中旬～2月中旬まき、4月下旬～5月上旬どりに適する(県北)。
はる 春	おう 桜 ぶ 舞	雪印	晩生	淡緑	中	極晩	強	総太	-	11月下旬～1月上旬まき、4月どりに適する(県北)。

z)は種後、長繊維不織布(パスライト)をべたがけし、その上に割繊維不織布(ベタロン)をべたがけする。

(2) 春まき[2月下～4月上まき・5月下～6月上どり]

品 種 名	種 苗 会社名	特 性 一 覧								備 考
		早晩性	首色	抽根性	抽だい性	耐寒性	根 形	ウイルス		
晩 々 G	雪 印	中生	緑	中	極晩	-	総太	-	2～3月まき、トンネル、マルチべたがけに適する。	

(3) 夏まき[8月まき・10月どり]

品 種 名	種 苗 会社名	特 性 一 覧								備 考
		早晩性	首色	抽根性	抽だい性	耐寒性	根 形	ウイルス		
献 夏 青 首	サカタ	早生	緑	中	早	-	総太	強	軟腐病、萎黄病に強い。	
献 夏 37 号	サカタ	中生	緑	中	早	強	総太	強	萎黄病抵抗性。	

(4) 秋まき[9月上～10月上まき・11月上～3月上どり]

品 種 名	種 苗 会社名	特 性 一 覧								備 考
		早晩性	首色	抽根性	抽だい性	耐寒性	根 形	ウイルス		
福 誉	みかど	早生	濃緑	大	中	中	総太	強	萎黄病、軟腐病に強い。	
夏 の 翼	タキイ	早生	緑	中	-	弱	総太	-	9月20日までは種に適する。耐暑性強。軟腐病に強く、曲がり少ない。	
Y R 直 秋	カネコ	早生	緑	中	中	中	総太	中	萎黄病に強い。	
ふ ゆ と 人 88	ナント	早生	淡緑	中	中	強	総太	-		
青 誉	みかど	中生	緑	中	やや晩	中	総太	-	短葉でそろい良い。首内部の緑色強い。	
耐 病 総 太 り	タキイ	中生	淡緑	中	早	やや弱	総太	中	す入り遅い、加工にも適する。	
冬 し ぐ れ	サカタ	中生	緑	中	中	強	総太	中	青首内部は純白。収穫幅がある。	
湘 白	県種苗協	中生	白	中	中	中	総太	-	年内どりに向く。す入り遅い、加工にも適。葉は大きく、毛じがない。 PVP	
冬 み ね 2 号	サカタ	晩生	緑	中	晩	強	総太	中	一般地ではトンネル被覆、三浦では2月中旬までに収穫。黒班細菌病に比較的強い。	

(5) 晩秋まき(三浦半島地域) [10月上中まき・3月中下どり]

品 種 名	種 苗 会 社 名	特 性 一 覧							備 考
		早晩性	首色	抽根性	抽だい性	耐寒性	根 形	ウイルス	
はるうたげ宴 春	雪印	晩生	薄緑	中	極晩	強	総太	-	「冬みね」より根長が確保でき、3月中旬まで晩抽性が安定。
冬みね2号	サカタ	晩生	緑	中	晩	強	総太	中	

2 赤ダイコン・ミニダイコン・辛味ダイコン

(1) 秋まき [9月上～10月上まき・11月～1月どり]

品 種 名	種 苗 会 社 名	特 性 一 覧							備 考
		早晩性	首色	抽だい性	ス入り	根 形	用 途		
紅 化 粧	サカタ	早生	赤	早	遅	総太	サラダ・酢漬け	根長20～25cm、根径約6cmの赤ダイコン。9月まきに適する。	
紅 く る り	松 永	早生	赤	中	遅	長卵形	サラダ・酢漬け	根長10～20cm、根径8～12cmの赤ダイコン、根重300～1000gで収穫。9月まきに適するが、春まきも可能。	
三 太 郎	タキイ	早生	淡緑	極晩	ごく遅	総太	煮食	根長20～30cm、根径8cm、耐寒性強く冬～春どりも適する。	
味 い ち ば ん	シンジェンタ	早生	緑	晩	遅	総太	多用途	根長23cm、根重約1.2kg。ス入り遅く、収穫期の幅が広い。	

3 コ カ ブ

(1) 春まき [3月中～4月中まき・5月中～7月上どり]

品 種 名	種 苗 会 社 名	特 性 一 覧							備 考
		早晩性	根形	葉の大小	耐寒性	耐暑性	す入り	抽だい性	
C R も ち ば な	タキイ	早生	腰高	小	-	強	晩	-	葉が伸び過ぎない。
ゆ き わ ら し	カネコ	早生	円	中	強	-	晩	晩	白さび病に強い。秋まきも適する。
へき じゆ 碧 寿	武蔵野	早生	腰高	中	中強	強	晩	晩	根こぶ病に強い。

(2) 夏まき [7月上～8月下まき・8月中～10月中どり]

品 種 名	種 苗 会 社 名	特 性 一 覧							備 考
		早晩性	根形	葉の大小	耐寒性	耐暑性	す入り	抽だい性	
C R も ち ば な	タキイ	早生	腰高	小	-	強	晩	-	葉が伸び過ぎない。す入り遅い。
C R き ら り の 夏	ノウリン	早生	腰高	小	-	強	-	-	耐暑性があり、根こぶ病に強い。
(新) へき じゆ 碧 寿	武蔵野	早生	腰高	中	中強	強	晩	晩	根こぶ病耐病性で、耐暑性がある。

(3) 秋まき [9月上～10月中まき・10月中～12月中どり]

品 種 名	種 苗 会 社 名	特 性 一 覧							備 考
		早晩性	根形	葉の大小	耐寒性	耐暑性	す入り	抽だい性	
C R 白 涼	トーホク	早生	腰高	中	強	-	晩	晩	根こぶ病抵抗性。裂根少ない。
は く た か 鷹	武蔵野	早生	腰高	中	強	中	晩	極晩	裂根、変形が少ない。
ス ワ ン	タキイ	早生	扁円	中	中	-	晩	晩	小カブから中大カブまで用途広い。
き ら り の ゆ め	ノウリン	早生	扁円	小	強	-	晩	晩	肌が色白できれい。葉が短い。
あ や め 雪	サカタ	早生	扁円	中	強	中	晩	晩	上部が紫、下部が白のコカブ。
雪 牡 丹	武蔵野	中生	扁円	中	中	強	晩	晩	白さび病、根こぶ病に強い。

(4)冬まきトンネル[11月中～2月中まき・2月下～4月下どり]

品 種 名	種 苗 会 社 名	特 性 一 覧								備 考
		早晩性	根形	葉の大小	耐寒性	耐暑性	す入り	抽だい性		
白 鷹	武蔵野	早生	腰高	中	強	-	晩	極晩	耐寒性強い。晩抽性で草姿は立性。	
し ろ か も め	武蔵野	早生	腰高	中	強	-	晩	極晩	「白鷹」にほぼ似る。	
C R 白 涼	トーホク	早生	腰高	中	強	-	晩	晩	根こぶ病抵抗性、裂根少ない。	

4 ゴ ボ ウ

(1)春まき[3月下～6月上まき・8月下～3月下どり]

品 種 名	種 苗 会 社 名	特 性 一 覧						備 考
		早晩性	長さ	太さ	肌 色	す 入 り		
山 田 早 生	みかど	早生	中	中太	中濃(白肌)	中晩	根の先端まで肉づきが良い。	
正 作	カネコ	早生	中	中太	淡(白肌)	晩	早生で在ほ性が高く、そろいよい。	
て が る	柳 川	早生	短	太	中(白肌)	早	タキイからは「サダラむすめ」で販売、サラダ利用が可能。	
ダ イ エ ッ ト	サカタ	早生	短	中太	淡(白肌)	晩	側根少ない。	
直 輝	ノウリン	中生	中	中太	中(白肌)	晩	早生で在ほ性が高く、そろいよい。	

(2)秋まき[9月下まき・6月上～9月上どり]

品 種 名	種 苗 会 社 名	特 性 一 覧					備 考
		早晩性	長さ	太さ	肌 色	す 入 り	
柳 川 理 想	柳 川	中生	中	中	淡(白肌)	晩	
山 田 早 生	各 社	早生	中長	中太	中濃(白肌)	中晩	抽だい少ない。

5 ニ ン ジ ン

(1)夏まき年内どり[7月上～下まき・11月上～12月下どり]

品 種 名	種 苗 会 社 名	特 性 一 覧								備 考
		早晩性	根長	根色	根形	尻詰まり	吸込性	耐寒性		
愛 紅	住 化	早生	約20	鮮紅	円筒	ごく良	中	やや強	多肥に注意。吸込性やや弱く土寄せする。	
紅 う ら ら	住 化	早生	18～20cm	鮮紅	やや肩張り	良	有	強	吸い込み性が弱いので、適宜土寄せを行う。	
向 陽 二 号	タキイ	中早生	18cm	鮮紅	やや肩張り	良	有	強	しみ症に強く栽培しやすい。	
ア ロ マ レ ッ ド	トーホク	中早生	18～19	濃紅	円筒	良	有	中	ニンジン臭少ない。黒葉枯病、しみ腐病に比較的強い。	
ひ と み 五 寸	カネコ	中生	18～19	濃紅橙色	中	やや良	有	強	多肥に注意する。	
黒 田 五 寸	各 社	中生	19～21	濃鮮紅	やや肩張り	やや良	無	中	寒さで肩が緑紫色に変色しやすい。	

(2)夏まき越冬どり[8月上～8月中まき・1月上～3月上どり]

品 種 名	種 苗 会社名	特 性 一 覧							備 考
		早晩性	根長	根色	根形	尻詰まり	吸込性	耐寒性	
あやほまれ誉	フジイ	早生	16～18cm	濃紅	やや肩張り	ごく良	中	強	早太りで揃いが良い。
陽州五寸	タキイ	中早生	17～21cm	鮮橙紅色	中	やや良	有	強	しみ症に強く栽培しやすい。
向陽二号	タキイ	中早生	18	鮮紅	やや肩張り	良	有	強	しみ症に強く栽培しやすい。
ひとみ五寸	カネコ	中生	18～19	濃紅橙色	中	やや良	有	強	多肥に注意する。
らいむ五寸	ウエキ	中生	18～20	濃紅	やや肩張り	やや良	有	強	在ほ性高く、割れにくい。
ベーターリッチ	サカタ	中生	21	鮮紅	円筒	良	有	強	β-カチン含量高く食味良好。晩抽で作型適応性が広い。
冬越黒田五寸	各社	中生	19～21	濃鮮紅	やや肩張り	やや良	有	強	吸込性強く耐寒性あり。

(3)冬まきトンネル[12月中～2月下まき・5月～6月どり]

品 種 名	種 苗 会社名	特 性 一 覧							備 考
		早晩性	根長	根色	根形	尻詰まり	吸込性	耐寒性	
向陽二号	タキイ	早生	18～19cm	鮮紅	やや肩張り	良	有	強	夏まき兼用種、早太り。
愛紅	住化	早生	約20	濃鮮紅	円筒	ごく良	中	やや強	12月以降に播種する。
あやほまれ誉	フジイ	早生	16～18cm	濃紅	やや肩張り	ごく良	中	強	早太りで揃いが良い。
紅うらら	住化	早生	18～20cm	鮮紅	やや肩張り	良	有	強	吸い込み性が弱いいため、適宜土寄せを行う。
ちはま五寸	ウエキ	中生	約18	濃紅橙	やや肩張り	良	有	やや強	夏まき兼用種、ジュース、生食に適し、食味良。

6 ショウガ

(1)露地 [4月下～5月上植えつけ・7月中～11月上どり]

品 種 名	種 苗 会社名	特 性 一 覧					備 考
		草たけ	茎の数	芽の色	塊茎の大きさ	塊茎の辛味	
三州	全農 かながわ他	低	中～多	淡	中	少～中	葉ショウガ、軟化栽培にも用いられる。
谷中	-	中	多	中	小	中	低温発芽性があり、葉ショウガに適する。
金時	全農 かながわ他	中	多	濃	小	強	早生で葉ショウガ、軟化栽培に適する。
インド	-	高	少	淡	大	少	加工用に適し、種の貯蔵性は低い。
らくだ	-	高	少	淡	中	少	加工用に適する。

Ⅱ 葉 茎 菜 類

1 キ ャ ベ ツ

(1)夏まき[7月中～8月中まき、11月上～1月中どり]

品 種 名	種 苗 会社名	特 性 一 覧							備 考	
		早晚性 (定植後日数)	球 形	系 別	耐暑性	耐寒性	萎黄病 ²⁾	球 重		
らん 藍	てん 天	サカタ	早(60～65日)	扁円	中間	ごく強	低	抵抗性	1.5kg	耐暑性強く石灰欠乏、株腐病が出にくい。10月収穫可能。
しずはま1号	石井		早(60～65日)	扁円	中間	強	低	抵抗性A	1.5	やや甲高球で黒腐病に強い。「藍天」に続き12月上旬収穫まで適する。
しずはま2号	石井		早(60～65日)	扁円	中間	強	低	抵抗性A	1.5	黒腐病に強い。熟期などは「しずはま1号」に似る。
新 藍	サカタ		中早(65日)	扁円	中間	ごく強	中	抵抗性A	1.6	各種病害に強く、10月収穫可能。
い ろ ど り	カネコ		中早(60～70日)	扁円	中間	やや強	中	抵抗性A	1.5	球色濃い、葉質はやや硬い。「しずはま1号」「同2号」に続き年内どり。
F ₁ かぎろひ	大和		中早(65～70日)	扁円球	中間	中	中	抵抗性A	1.6	茎は硬い、年内どりに適する。
浜 岬	タキイ		中早(65～75日)	やや腰高球	春	-	やや強	抵抗性A	1.3	外葉は小ぶり。年内どりに適する。
YR春系305号	増田		中早(70日～)	扁円	春	-	強	抵抗性B	1.5	耐寒性が強く、裂球少ない。萎黄病抵抗性Bで早どり不適。11月下旬～2月どり。

2)抵抗性Aは、高温期育苗で安定した抵抗性を示し、そうでないものは抵抗性Bで示す。

(2)夏まき(業務用適性あり)[7月中～8月中まき・11月上～4月下どり]

品 種 名	種 苗 会社名	特 性 一 覧							備 考	
		早晚性 (定植後日数)	球 形	系 別	耐暑性	耐寒性	萎黄病	球 重		
YRしぶき2号	石井		早(65～90日)	扁円球	寒玉	中	中	抵抗性A	1.5kg	10月中旬～年内どりに適する。
Y R 藍 宝	ハウリン		中早(65～70日)	扁円球	寒玉	強	中	抵抗性A	1.5	7月下旬まき。8月下旬定植。12月どりに適する。
YR冬どり錦秋	増田		中(70～100日)	扁円球	寒玉	-	強	抵抗性A	1.7	生育良く、在ほ性高い、年内～1月どり。
冬 駿 河	石井		中(95～120日)	扁円球	寒玉	やや強	中	-	1.5	11月～年内どりに適する。
夢 舞 台	タキイ		中晩	扁円球	寒玉	-	強	抵抗性	1.5	1～2月どりに適する。
冬 く ぐ り	カネコ		中晩	甲高	寒玉	-	強	-	1.5	耐寒性強く裂球遅い。黒腐病にやや弱い。9月中旬定植、3月上～4月上旬どり。
冬 の ぼ り	野崎		晩	扁円球	寒玉	-	強	-	1.5	耐寒性強く、裂球遅い。9月中旬定植、4月中～下旬どり。

(3)秋まき[9月下～10月上まき・4月～6月どり]

品 種 名	種 苗 会社名	特 性 一 覧							備 考	
		早晚性	球 形	系 別	耐暑性	耐寒性	萎黄病	球 重		
金 系 2 0 1 号	サカタ		早生	扁円形	春	-	中	-	1.4kg	玉の肥大が良く、品質良。
中 早 生 二 号	サカタ		中早生	扁円形	春	-	強	-	1.5	

(4)晩秋まき[10月中～11月下まき・5月中～7月中どり]

品 種 名	種 苗 会社名	特 性 一 覧								備 考
		早晩性	球 形	系 別	耐暑性	耐寒性	萎黄病	球 重		
初 恋	トーホク	早生	扁円球	寒玉	やや強	中	抵抗性	1.5	玉揃いが良く腐敗病に強い。	
か ん ろ く	増 田	早生	扁円形	寒玉	-	強	-	1.3	旧品種名「秋蒔早生寒玉No.6」	
中 早 生 二 号	サカタ	中早生	扁円球	春	-	強	-	1.5kg	玉のしまりが良く、裂球も遅い。	
秋 蒔 中 早 生 3 号	石 井	中早生	扁円球	春	-	強	-	1.4	秋まきに最適だが、春まき、夏まきも可。	
さ つ き 王	ノウリン	中早生	扁円球	寒玉	-	中	-	1.3	外葉コンパクトで、「さつき女王」より早生。	
さ つ き 女 王	ノウリン	中早生	扁円球	寒玉	-	中	-	1	外葉コンパクト。	
み く に	カネコ	中早生	扁円形	寒玉	-	強	抵抗性A	1.5	5月後半以降で安定している。	
Y R あ お ば	増 田	中生	扁円球	寒玉	-	中	抵抗性	1.5	外葉が大きくなりやすい。	
Y R 天 空	タキイ	中生	扁円形	寒玉	強	-	抵抗性	1.7	晩抽で在ほ性にすぐれている。6月どり。	
に し き 錦 ごい 恋	トーホク	中生	扁円球	寒玉	-	中	抵抗性	1.5	球芯は短く、しまりが良い。萎黄病に強い。	

(5)夏まき(三浦半島地域)[8月中～9月上まき・11月上～3月下どり]

品 種 名	種 苗 会社名	特 性 一 覧								備 考
		早晩性	球 形	系 別	耐暑性	耐寒性	萎黄病	球 重		
金 春	サカタ	早生	扁円形	春	やや強	中	-	1.6kg	石灰欠乏症が出やすい。	
浜 岬	タキイ	中早生	やや腰高球	春	-	やや強	抵抗性A	1.4	外葉はやや小ぶり。	
T - 5 1 9 S P	タキイ	中生	やや甲高球	春	-	強	抵抗性A	1.4		
春 の か ほ り SP	タキイ	中生	甲高扁円球	春	-	強	抵抗性	1.5	3月どり。晩抽性に優れる。腐敗性病害に比較的強い。	

(6)秋まき(三浦半島地域)[9月下～10月中まき・3月下～6月中どり]

品 種 名	種 苗 会社名	特 性 一 覧								備 考
		早晩性	球 形	系 別	耐暑性	耐寒性	萎黄病	球 重		
金 系 2 0 1 E X	サカタ	極早生	扁円球	春	-	中	-	1.4	玉の肥大がよく一斉収穫に適する。	
金 系 2 0 1 号	サカタ	早生	扁円形	春	-	中	-	1.4kg	玉の肥大がよく品質良。	
初 恋	トーホク	早生	扁円形	寒玉	やや強	中	抵抗性	1.5	業務用として導入されている。	
中 早 生 二 号	サカタ	中早生	扁円球	春	-	強	-	1.5		
秋 蒔 中 早 生 3 号	石 井	中早生	扁円形	春	-	強	-	1.4	秋まきに最適だが、春まき、夏まきも可。	

(7)特殊キャベツ 夏まき [7月中～8月中まき・11月～1月どり]

品 種 名	種 苗 会社名	特 性 一 覧							備 考
		早晩性	球 形	系 別	耐暑性	耐寒性	萎黄病	球 重	
ネ オ ル ビ ー	タキイ	早生	丸形球	赤	やや強	-	-	0.7kg	早生で生育の早い赤キャベツ。

2 ハ ク サ イ

(1)秋まき①[8月中下～9月上まき・11月中～12月どり]

品 種 名	種 苗 会社名	特 性 一 覧								備 考
		生育日数	草姿	球重	葉色	耐寒性	球型	抽だい性		
タイニーシュシュ	サカタ	は種後 45～65日	立	0.25～ 1.2kg	鮮緑	—	円筒	並	耐暑性に優れるミニハクサイ。	
極 意	カネコ	50～55	中開	1.0～ 1.2	淡緑	—	砲弾	早	軟腐病に強く、サクサクした食感で生食 向きミニハクサイ。	
わ 娃 々 さ い 菜	トキタ	60	立	0.5～ 1.0	濃緑	—	長円筒	—	軟腐病に強く、早生のミニハクサイ。	
黄 ご ころ 6 5	タキイ	定植後 65日	立	2.5～ 3.0	濃緑	中	砲弾	—	黄芯系。	
はれ 晴 ぎ 黄 7 5	タキイ	75	立	2.5～ 3.0	濃緑	中	砲弾	—	黄芯系。べと病、石灰欠乏症に強い。	
黄 ご ころ 8 0	タキイ	80～90	中開	3.0～ 4.0	濃緑	中	砲弾	—	黄芯系。根こぶ病に強く、品質優れる。	
晴 黄 8 5	タキイ	85	立	3.0～ 3.5	濃緑	中	砲弾	—	黄芯系。べと病耐病性。生理障害少ない。	

(2)秋まき②[9月上まき・1月中～2月下どり]

品 種 名	種 苗 会社名	特 性 一 覧								備 考
		生育日数	草姿	球重	葉色	耐寒性	球型	抽だい性		
き 黄 しょう 将	カネコ	定植後 85日	立	約5kg	緑	強	砲弾	—	根こぶ病等病害に強い。	
き ぼう ほう 黄 望 峰 9 0	カネコ	90	立	約4	緑	強	砲弾	—	耐寒性強く、肥大すぐれる。	

(3)秋まき③[9月中下まき・12月下～2月下どり]

品 種 名	種 苗 会社名	特 性 一 覧								備 考
		生育日数	草姿	球重	葉色	耐寒性	球型	抽だい性		
さい じ 時 き 黄	カネコ	定植後 100～ 120日	立	2.5～ 3.0kg	濃緑	極強	砲弾	晩	9月15日まで播種可能。	
ほ ま れ の 極 み	タキイ	100～ 120	中開	2.5～3.0	濃緑	極強	砲弾	晩	9月25日まで播種可能。	

(4)春まき[1月下～3月下まき・5月上～5月下どり]

品 種 名	種 苗 会社名	特 性 一 覧								備 考
		生育日数	草姿	球重	葉色	球内色	球型	抽だい性		
は る さ か り	渡辺採種	定植後 70～ 80日	立	2.5～ 3.0kg	緑	白	円筒	極晩	加温育苗、トンネル栽培用品種。	

3 ホウレンソウ

(1)春まき[3月上～5月下まき・4月下～7月中どり]

品 種 名	種 苗 会社名	特 性 一 覧							備 考
		早晩性	種別	葉色	葉型	草姿	抽だい性	べと病(R)	
パ レ ー ド	サカタ	早生	雑種	やや濃	中間	半立性	中早	1	9月～翌2月まきにも適するが、べと病に弱いので、防除を徹底する。
ミ ラ ー ジ ュ	サカタ	中早生	雑種	極濃	中間	立性	晩	1～ 7,9,11,13, 15,16	強度の萎凋病耐病性。4月下旬まきは抽だいする。
プリウスアーリー7	トキタ	中早生	雑種	濃	中間	立性	晩	1～ 7,9,11,13, 15	生育はやや遅い、6月どりでも抽だいしない。
ド ン キ ー	サカタ	中早生	雑種	極濃	中間	立性	中早	1～ 11,13,15, 16	在ほ性が高い。4～5月まきは抽だいする。

(2)夏まき[7月中～8月下まき・8月下～10月中どり]

品 種 名	種 苗 会社名	特 性 一 覧							備 考
		早晩性	種別	葉色	葉型	草姿	抽だい性	べと病(R)	
ミ ラ ー ジ ュ	サカタ	中早生	雑種	極濃	中間	立性	晩	1～ 7,9,11,13, 15,16	立性で、葉色が濃く株張り良い。
プ リ ウ ス	トキタ	中生	西洋種	濃	中間	立性	極晩	1～ 5,8,9,11, 12,14,15	耐暑性強。
ジョーカーセブン	トキタ	晩	雑種	濃	中間	立性	晩	1～ 7,9,11,13, 15,16	

(3)秋まき[9月上～10月下まき・10月上～1月上どり]

品 種 名	種 苗 会社名	特 性 一 覧							備 考
		早晩性	種別	葉色	葉型	草姿	抽だい性	べと病(R)	
オ シ リ ス	サカタ	早生	雑種	極濃	中間	立性	やや晩	1～10,15	耐寒性が強く、湿害による黄化が出にくい。
冬 ご の み	タキイ	早生	雑種	極濃	剣葉	立性	やや晩	1～ 10,15	東洋種の草姿で、丸ダネ。
ハ ン タ ー	カネコ	やや早生	雑種	極濃	中間	立性	やや晩	1～ 7,9,11,13, 15,16	葉色の光沢が強い。
ミ ラ ー ジ ュ	サカタ	中早生	雑種	極濃	中間	立性	晩	1～ 7,9,11,13, 15,16	
ド ン キ ー	サカタ	中早生	雑種	極濃	中間	立性	中早	1～ 11,13,15, 16	在ほ性が高く、軸折れしにくい。
ク ロ ノ ス	サカタ	中生	雑種	極濃	中間	立性	中	1～ 7,9,11,13, 15,16	葉色濃く、耐湿、耐寒性が優れる。
雪 美 菜 0 2	雪 印	晩	雑種	濃	中間	半立性	やや晩	1～7	寒締め栽培に向く。

(4)冬まきべたがけ・トンネル[2月上～2月下まき・4月下～5月中どり]

品 種 名	種 苗 会社名	特 性 一 覧							備 考
		早晩性	種別	葉色	葉型	草姿	抽だい性	べと病(R)	
ア グ レ ッ シ ブ	サカタ	早生	雑種	極濃	中間	立性	-	1～ 7,9,11,13, 15,16	「クロノス」に似ており、低温伸長性高い。露地で11月上旬まき2月どりにも適する。
ス パ イ ダ ー	トキタ	早生	雑種	極濃	中間	立性	-	1～ 7,9,11,13, 15,16	葉柄がしなやかで、バランス良く伸び作業性良い。秋まき越年どりにも適する。
ハ ン タ ー	カネコ	やや早生	雑種	極濃	中間	立性	やや晩	1～ 7,9,11,13, 15,16	葉色の光沢が強い。
ミ ラ ー ジ ュ	サカタ	中早生	雑種	極濃	中間	立性	晩	1～ 7,9,11,13, 15,16	2月まき4月中旬どりまでに適する。
ク ロ ノ ス	サカタ	中生	雑種	極濃	中間	立性	中	1～ 7,9,11,13, 15,16	葉色濃く、耐湿・耐寒性に優れる。

4 根 深 ネ ギ

(1)秋冬どり[2月上～4月上まき・10月中～2月中どり]

品 種 名	種 苗 会社名	特 性 一 覧							備 考
		早晩性	抽だい性	分けつ	首のしまり	草たけ	軟白長	耐寒性	
夏 扇 パ ワ ー	サカタ	早生	中	無	やや良	中	40 ～45cm	強	太りが多く多収型。F1品種。
龍 輝	ウエキ	早生	中	無	良	高	40	強	夏場の病害や過湿、過乾燥等に強く、収量性や秀品率に優れるF1黒柄品種。
夏 扇 3 号	サカタ	中早生	中	無	良	中	35～40	強	べと病、さび病、黒斑病に強い。F1品種。
りゅう しょう 龍 翔	ウエキ	中早生	中	無	良	高	40～45	強	高温、乾燥、湿害に強く、欠株になりにくい。F1品種。
十 国 一 本 太	トキタ	中早生	中	無	良	高	40～45	強	葉鞘部はやや曲がりやすいが、純白で品質が良い、早太性がある。固定種。
夏 扇 4 号	サカタ	中早生	中	無	良	高	40	強	そろい良、安定多収のF1黒柄品種。
(新)夏扇タフナー	サカタ	中早生	中	無	良	中～高	35～40	強	強風でも倒伏しにくく、曲がりの発生が少ない。晩抽性やや劣る。
西 田	カネコ	中生	中	2～3	やや良	高	40～45	強	多収性の土ネギ用品種。固定種。
湘 南 一 本	県種苗協	中生	中	1～2	良	高	40～45	強	「湘南」より葉折れにくく、肉質は柔らかく食感よい固定種。 (PVP)

(2)夏秋どり[9月下～11月中まき・7月下～10月上どり]

品 種 名	種 苗 会社名	特 性 一 覧							備 考
		早晩性	抽だい性	分けつ	首のしまり	草たけ	軟白長	耐寒性	
春 扇	サカタ	早生	極晩	無(本)	やや良	中	35 ～40cm	強	10月まき5～6月どりが可能な極晩抽性一本ネギ。F1品種。
夏 扇 パ ワ ー	サカタ	早生	中	無	良	中	40	強	夏扇シリーズでは早生、多収で、低温伸長性も高い。F1品種。
長 悦	みかど	中生	晩の中	無	やや良	高	45～50	強	トンネル育苗、4月上旬～5月中旬定植で7～8月どり。固定種。
ホ ワ イ ト ス タ ー	タキイ	中生	中	無	良	高	40～50	強	揃いが良い。秋まきでは摘蕾を要する。春まきもできる。

(3)夏どり[12月上～1月上まき・6月下～8月中どり]

品 種 名	種 苗 会社名	特 性 一 覧							備 考
		早晩性	抽だい性	分けつ	首のしまり	草たけ	軟白長	耐寒性	
吉 蔵	武蔵野	早生	-	無	やや良	中	35 ～40cm	耐暑性 強	肉質柔らかく美味。太みがある品種。固定種。
東 京 夏 黒 2 号	トキタ	中生	-	無	良	高	40～45	強	耐病性に優れ多収。固定種。

(4)春どり[3月下～6月中まき・4月上～5月上どり]

品 種 名	種 苗 会社名	特 性 一 覧							備 考
		葉の色	抽だい性	分けつ	首のしまり	草たけ	軟白長	耐寒性	
羽 緑 一 本 太	トーホク	濃緑	晩	ごく少	良	中	35 ～40cm	強	3月下旬～4月上旬まき、翌年4～5月どりに適する。
春 扇	サカタ	緑	やや晩	ごく少	良	中	35～40	強	6～7月まき、翌年3～4月どりに適する。
初 夏 扇	サカタ	濃緑	晩	無	良	短	35～40	強	コンパクトで晩抽性、耐暑性あり。

5 葉 ネ ギ

(1)春・夏まき[3月～7月まき・6月～12月どり]

品 種 名	種 苗 会社名	特 性 一 覧						備 考
		早晚性	葉色	太さ	耐暑性	耐寒性	葉折れ	
若 侍	武蔵野	中生	濃	細	中	やや強	少	F1品種で揃いが良い。
わ か さ ま 黒	武蔵野	中生	濃	細	中	やや強	少	葉色濃くラッキョウ根にならない。

(2)秋・冬まき[9月～11月まき・1月～3月どり]

品 種 名	種 苗 会社名	特 性 一 覧						備 考
		早晚性	葉色	太さ	耐暑性	耐寒性	葉折れ	
わ か さ ま 黒	武蔵野	中生	濃	細	中	やや強	少	葉色濃くラッキョウ根にならない。

6 株 ネ ギ

(1)秋植え・初夏どり[9月～10月植え付け・5月～6月どり]

品 種 名	種 苗 会社名	特 性 一 覧					備 考
		草たけ	葉しょう直 径	分けつ数	抽だい性	収穫適期	
坊 主 知 ら ず	-	70cm	2.0～ 3.5cm	4～6本	極微	5～6月	葉は固く、分けつ少ない。

(2)夏植え・春どり[8月植え付け・3月～5月どり]

品 種 名	種 苗 会社名	特 性 一 覧					備 考
		草たけ	葉しょう直 径	分けつ数	抽だい性	収穫適期	
わ け ネ ギ	-	60cm	1.0～ 1.5cm	8～13本	無	5～6月	品質・食味がよい。

7 タ マ ネ ギ

(1)早春どり[8月下～9月上まき・3月どり]

品 種 名	種 苗 会社名	特 性 一 覧					備 考
		早晩性	球の形	球重	貯蔵限界	球色	
はま 浜	カネコ	超極早生	甲高	250g	-	黄	12月中旬にトンネルをかける。 PVP
貴 濱	錦 カネコ	極早生	球	240	-	黄	12月中旬にトンネルをかける。
の 宝	カネコ	極早生	球	240	-	黄	やや耐寒性がある。

(2)秋まき[9月上～9月下まき・4月中～6月中どり]

品 種 名	種 苗 会社名	特 性 一 覧					備 考
		早晩性	球の形	球重	貯蔵限界	球色	
貴 ソ ニ ッ ク	錦 カネコ	極早生	球	300g	9月下旬	褐	首部は細く、よくしまる。べと病、灰色か び病に強い。 有機質が不足すると形や大きさが乱れ る。 球は大きく、よくそろ。首長で11月まで 貯蔵可能。 べと病、灰色腐敗病に強い。豊円球。 大玉で多収。12月末まで貯蔵可能。 貯蔵に優れる。 貯蔵性大。多肥は避ける。止め肥は3月 中旬まで。 機能性成分ケルセチンを多く含み長期 貯蔵が可能。 「湘南レッド」より収穫期が10～14日早 い。 生食用赤タマネギ、多汁で肉質良。
七 宝 早 生 7 号	七 宝	早生	球	240	8月下旬	黄	
0 ・ L 黄	タキイ	中生	中甲球	340	11月下旬	黄褐	
タ ー ボ	タキイ	中生	球	300	12月下旬	褐	
0 ・ P 黄	タキイ	中生	甲高	320	12月下旬	褐	
ヒ ー ロ ー	カネコ	中生	球	300	10月下旬	黄褐	
ネ オ ア ー ス	タキイ	中晩生	豊円	350	3月下旬	褐	
も み じ 3 号	七 宝	中晩生	球	300	1月下旬	褐	
ケ ル た ま	タキイ	晩生	中甲高	280	3月末	褐	
早 生 湘 南 レ ッ ド	県種苗協	中生	扁円	300	9月下旬	赤紫	
湘 南 レ ッ ド	県種苗協	中晩生	扁円	300	9月下旬	赤紫	

8 ラ ッ キ ョ ウ

(1)夏植え[8月下～9月中植え付け・6月中～7月中どり]

品 種 名	種 苗 会社名	特 性 一 覧					備 考
		早晩性	鱗片の大きさ	草たけ	葉数	葉色	
八 房	各社	中生	中	中	中	淡緑	
ら く だ	各社	晩生	大	高	少	濃緑	

9 ニ シ ニ ク

(1)秋植え[9月下～10月下植え付け・5月どり]

品 種 名	種 苗 会社名	特 性 一 覧					備 考
		早晚性	鱗片数	球の大きさ	球重	草丈	
上海種[嘉定種]	各社	極早生	6～9	6 cm	80g	-	暖地系。種苗会社によって「上海種」「嘉定種」「上海嘉定種」「上海種(嘉定種)」などの名称で販売されている。
平 戸	八江	早生	8～10	7～8	100～150	1m	暖地系。ウイルスフリー。大球種。
ホワイト六片	各社	中生	6	7	80～100	60～80cm	寒地系。青森県の在来種「福地ホワイト」の選抜系と思われ、他に、「ニューホワイト六片」「福地系スーパーホワイト六片」などの名称での販売がある。


10 葉 ニ シ ニ ク

(1)秋冬どり[9月上～下植え・11月～2月どり]

品 種 名	種 苗 会社名	特 性 一 覧					備 考
		葉幅	葉色	分げつ	休眠性	抽だい性	
ハ ー リ ッ ク	八江	広	濃緑	少	あり	やや早い(4月)	暖地系ニンニクで、2月までの収穫を終える。

11 ニ ラ

(1)夏どり[3月上～4月中まき・翌年以降5月～9月どり]

品 種 名	種 苗 会社名	特 性 一 覧					備 考
		葉幅	葉色	分げつ	休眠性	抽だい性	
ス ー パ ー グリーンベルト	武蔵野	広	濃緑	多	弱	晩(8月)	低温、高温いずれにも強く、晩抽性で周年栽培用品種。
ミ ラ ク ル グリーンベルト	武蔵野	広	濃緑	中	やや弱	やや晩(7月)	低温伸長性あり。秋冬どりに適する。立性で作業性良い。 

12 シ ュ ン ギ ク

(1)露地[3月下～9月下まき・5月中～12月上どり]

品 種 名	種 苗 会社名	特 性 一 覧								備 考
		早晩性	草姿	葉型	節間	抽だい性	耐寒性	耐暑性		
中 葉 春 菊	ウエキ	早生	立	中葉	短	早	強	中の強	茎に甘みがあり、香りが少ない。サラダ用シュンギク。 抽だいのため4～5月まきは不適。べと病強。 耐暑性弱く、7～8月まきは不適。炭そ病強。 分枝の発生多く、摘み取りが容易。	
ス テ イ ッ ク シ ュ ン ギ ク	武蔵野	早生	立	小葉	ごく長	-	-	-		
さ と ゆ た か	サカタ	早生の中	立	中葉	中	早	強	中の強		
大 江 戸	武蔵野	早生の中	株張	中葉の小葉	短	中	弱	弱		
株 張 中 葉 春 菊	タカヤマ	中生	株張	中葉	短	晩	弱	中		

(2)秋まき・ハウス摘み取り[9月下～10月中まき・11月下～2月下どり]

品 種 名	種 苗 会社名	特 性 一 覧								備 考
		早晩性	草姿	葉型	節間	抽だい性	耐寒性	耐暑性		
中 葉 春 菊	ウエキ	早生	立	中葉	短	早	強	中の強		

(3)冬まき・トンネル[11月上～3月上まき・1月中～5月中どり]

品 種 名	種 苗 会社名	特 性 一 覧								備 考
		早晩性	草姿	葉型	節間	抽だい性	耐寒性	耐暑性		
さ と ゆ た か	サカタ	早生の中	立	中葉	中	早	強	中の強		

13 ミ ツ バ

(1)軟化ミツバ[5月まき・11月～5月どり]

品 種 名	種 苗 会社名	特 性 一 覧			備 考
		抽だい性	葉身色	生育の早晩	
柳 川 2 号	柳 川	晩	緑	やや晩	抽だい遅く、低温でよく伸長する。

(2)根ミツバ[6月まき・3月中～4月中どり]

品 種 名	種 苗 会社名	特 性 一 覧			備 考
		抽だい性	葉身色	生育の早晩	
柳 川 2 号	柳 川	晩	緑	やや晩	低温伸長性があり、根株がよく充実する。

14 コ マ ツ ナ

(1)ハウス冬まき[10月下～3月上まき・1月上～4月上どり]

春まき露地[3月中～5月中まき・4月中～6月上どり]

品 種 名	種 苗 会社名	特 性 一 覧								備 考
		早晩性	抽だい性	葉色	草姿	葉型	萎黄病	白さび病		
わ か み	サカタ	早生	晩	濃	やや立	丸葉	強	強	葉の伸長バランス良く、作業性良い。	
な か ま ち	サカタ	中生	-	中	ごく立	丸葉	やや強	-	葉柄太多収。	
き よ す み	サカタ	中生	-	濃	やや立	丸葉	強	強	在ほ性が優れる。	

(2)初夏まき[5月下～7月中まき・6月中～8月上どり]

品 種 名	種 苗 会社名	特 性 一 覧							備 考
		早晚性	抽だい性	葉色	草姿	葉型	萎黄病	白さび病	
きよすみ	サカタ	中生	-	濃	やや立	丸葉	強	強	在ほ性が優れる。
いなむら	サカタ	中生	-	ごく濃	立	丸葉	強	-	耐暑性強く、葉柄が太い。
はっけい	サカタ	中生	-	ごく濃	立	丸葉	強	強	耐暑性強い。

(3)盛夏まき[7月下～9月上まき・8月中～9月下どり]

品 種 名	種 苗 会社名	特 性 一 覧							備 考
		早晚性	抽だい性	葉色	草姿	葉型	萎黄病	白さび病	
はっけい	サカタ	中生	-	濃	立	丸葉	強	強	耐暑性優れる。
いなむら	サカタ	中生	-	ごく濃	立	丸葉	強	-	白さび病抵抗性はない。
菜々音	タキイ	中生	-	ごく濃	立	丸葉	強	強	耐暑性が特に優れる。収穫しやすい。根はやや太い。
まさみ	トーホク	中晩生	-	ごく濃	ごく立	丸葉	強	-	
夏の甲子園	トキタ	晩生	遅	ごく濃	ごく立	丸葉	強	強	発芽直後からの生育速度が遅いので、過乾燥に注意。初夏まきも適する。

(4)秋まき[9月中～10月中まき・10月上～12月中どり]

品 種 名	種 苗 会社名	特 性 一 覧							備 考
		早晚性	抽だい性	葉色	草姿	葉型	萎黄病	白さび病	
わかみ	サカタ	早生	晩	濃	やや立	丸葉	強	強	葉の伸長バランス良く作業性良い。
きよすみ	サカタ	中生	-	濃	やや立	丸葉	強	強	在ほ性が優れる。
はっけい	サカタ	中生	-	濃	立	丸葉	強	強	耐寒性がある。

(5)冬まき露地(べたがけ)[10月下～3月上まき・12月下～4月上どり]

品 種 名	種 苗 会社名	特 性 一 覧							備 考
		早晚性	抽だい性	葉色	草姿	葉型	萎黄病	白さび病	
夏楽天	タキイ	早生	晩	中	立	丸葉	-	-	食味が良い。
わかみ	サカタ	早生	晩	濃	やや立	丸葉	強	強	
みなみ	トーホク	中生	-	濃	ごく立	丸葉	やや強	-	遅まき抽だい注意。直根が太いので株間約3cmとする。

15 ツ ケ ナ 類

(1)周 年

品 種 名	種 苗 会社名	特 性 一 覧					備 考
		耐寒性	耐暑性	抽だい性	早晚性	葉色	
べんり菜	タキイ	やや強	強	晩	早生	緑	「友好菜」より葉柄細く、尻も細い。
東京べかな	トキタ	弱	強	中	早生	淡緑	生育が早く、多収性。
はまみなと (べかな)	サカタ	弱	強	中	早生	淡緑	F ₁ で揃いが良い。生育はやや遅い。

16 カラシナ・タカナ類

(1)秋まき[9月上～10月中まき・11月中～3月どり]

品 種 名	種 苗 会社名	特 性 一 覧					備 考
		耐寒性	耐暑性	抽だい性	早晩性	葉色	
三 池 高 菜	各 社	強	中	晩	中晩生	濃緑	葉幅広くちぢみあり、良品質のタカナ。
さがみグリーン	県種苗協	中	-	晩	中早生	濃緑	葉柔らかく、表面に毛じない。立性で収穫しやすい。カラシナとタカナの交配種。
サラダからし菜	トキタ	-	-	-	早生	やや淡い	欠刻が深く、ミズナに似たカラシナで、適度の辛味食感をもつ。サラダ用。
わ さ び 菜	中 原	強	-	-	中生	濃緑	葉面がちりめん状で、大きい欠刻がある。
し 四 せん川 児 菜	中原採種場	中	中	中	中生	やや淡い	湖南児菜より、10～14日太り・抽苔とも遅い。
し 四 せん川 祝 菜	大和農園						
し 四 せん川 搾 菜	中原採種場	中	中	中	チュウセ中生	緑	貴州搾菜より、太りは10～14日遅い、型は筍型。
き 貴 州 搾 菜	中原採種場	中	中	やや晩	中早生	やや濃い	四川搾菜より、太りは10～14日早い、型は丸型。

17 ミ ズ ナ

(1)秋冬まき[8月中～11月まき・9月中～2月どり]

品 種 名	種 苗 会社名	特 性 一 覧				備 考
		早晩性	葉鞘の太さ	葉色	収量性	
京 み ぞ れ	タキイ	早生	極細	淡緑	やや少	
京 し ぐ れ	タキイ	早生	極細	緑	中	葉と茎の色のコントラストが強く外観が優れている。
金 賞 早 生 菜	丸 種	早生	細	緑	-	細くて白い葉軸、味が良い。
早 生 水 天	サカタ	早生	極細	鮮緑	大	低温期伸長性に優れる。

18 ナ バ ナ

(1)秋まき冬春どり

品 種 名	種 苗 会社名	特 性 一 覧						備 考
		早晩性	葉色	側枝	播種期	収穫期	花蕾色	
早 陽 一 号	サカタ	早生	緑	多	9中～10上	11下～3下	緑	耐寒性があり、多収。
オータムポエム	サカタ	早生	緑	多	9上～9中	11下～12下	黄～淡緑	抽だいたした茎葉・花蕾を食べる。
の ら ち ゃ ん 菜	カネコ	早生	緑	中	9上～10上	1下～3下	緑	生育中程度。
花 飾 り	サカタ	中生	緑	多	9中～10上	3～4	濃緑	生育旺盛で側枝太く出やすい。
C R 花 かんざし	丸 種	中生	緑	多	9上～10中	11下～3下	濃緑	根こぶ病抵抗性。
の ら ぼ う 菜	野 原	中生	緑	多	9上～10上	2中～4下	緑	生育旺盛。

19 チンゲンサイ

(1)春まき・トンネル[3月上中まき・5月上下どり]

品 種 名	種 苗 会社名	特 性 一 覧						備 考
		早晩性	抽だい性	葉身色	葉柄色	葉光沢	尻張り	
青 帝	サカタ	中生	やや晩	濃緑	淡緑	中	良	草姿は立性で、葉柄は厚みがあつて幅広、揃いが良い。

(2)春・秋まき[4月上～4月下まき・5月中～6月上どり、9月上～9月下まき・11月上～12月上どり]

品 種 名	種 苗 会社名	特 性 一 覧						備 考
		早晩性	抽だい性	葉身色	葉柄色	葉光沢	尻張り	
青 帝	サカタ	中生	やや晩	濃緑	淡緑	中	良	節間伸長少なく、周年栽培向き品種。
青 冨	サカタ	中生	やや晩	濃緑	淡緑	多	良	根こぶ病に強い。

(3)夏まき[5月上～8月上まき・6月中～9月下どり]

品 種 名	種 苗 会社名	特 性 一 覧						備 考
		早晩性	抽だい性	葉身色	葉柄色	葉光沢	尻張り	
夏 賞 味	武蔵野	やや晩	やや早	濃緑	淡緑	中	良	節間伸長少なく、株揃いが良い。
長 陽	タキイ	-	-	濃緑	-	中	良	草姿は立性で、葉は倒卵形。
ニイハオ新1号	渡辺農事	-	晩	濃緑	淡緑	中	-	節間伸長少なく、周年栽培向き品種。

(4)秋冬まき・ハウス[10月下～2月下まき・1月上～5月上どり]

品 種 名	種 苗 会社名	特 性 一 覧						備 考
		早晩性	抽だい性	葉身色	葉柄色	葉光沢	尻張り	
青 帝	サカタ	中生	やや晩	濃緑	淡緑	中	良	草姿は立性で、葉柄は厚みがあつて幅広、揃いが良い。
青 冨	サカタ	中生	やや晩	濃緑	淡緑	多	良	低温伸長性があり、晩抽性も安定している。

(5)周年まき[ただし、盛夏を除く。3月上・中まきはトンネル、10月下～2月下まきはハウス]

品 種 名	種 苗 会社名	特 性 一 覧						備 考
		早晩性	抽だい性	葉身色	葉柄色	葉光沢	尻張り	
シ ャ オ パ オ	サカタ	早生	やや早	中	淡緑	中	良	草丈10～15cmのミニチンゲンサイ。スジが少なく食感よい。

20 タ ア サ イ

(1)周 年

品 種 名	種 苗 会社名	特 性 一 覧					備 考
		耐寒性	耐暑性	抽だい性	早晩性	葉色	
緑 彩 二 号	サカタ	強	強	晩	中早生	黒緑	高湿期はやや立性になるが、低温期は開帳型になる。大型で周年栽培用品種。

21 葉 ダ イ コ ン

(1) 周 年

品 種 名	種 苗 会社名	特 性 一 覧							備 考
		早晩性	抽だい性	葉色	中肋色	草姿	欠刻	毛じ	
ハ ッ ト リ く ん	タキイ	中	中	緑	緑	半立	多	微	
葉 太 郎	タキイ	中	中	緑	緑	立	多	微	
葉 大 臣	サカタ	中	中	緑	緑	立	多	微	

22 エ ン サ イ

(1) 春・夏まき[5月上～8月中まき・7月上～10月中どり]

品 種 名	種 苗 会社名	特 性 一 覧					備 考
		耐暑性	耐湿性	耐寒性	葉色	分枝性	
エ ン サ イ	各 社	強	強	弱	緑	有	耐暑性強く、油炒め、おひたしなどに向く。

23 カ イ ラ ン

(1) 春・夏まき[5月中～8月下まき・6月下～10月下どり]

品 種 名	種 苗 会社名	特 性 一 覧					備 考
		早晩性	耐暑性	耐寒性	草姿	葉色	
宝 み ど り	武蔵野	早生 (約50日)	強	弱(18℃以上)	中開	濃緑	暑さに強い。茎に甘みがあり、薄く皮をむいて炒め物などに向く。

24 モ ロ ヘ イ ヤ

(1) 春・夏まき[5月上～6月上まき・7月～9月どり]

品 種 名	種 苗 会社名	特 性 一 覧					備 考
		耐暑性	耐寒性	葉色	分枝性	開花時期	
モ ロ ヘ イ ヤ	各 社	極強	弱(20℃以上)	濃緑	有	8下～9中	暑さに強い。茎葉にねばりがある。完熟した硬い種子には毒性があるが、葉や茎は無毒。

Ⅲ 洋 菜 類

1 レ タ ス

(1)春まき[3月上～3月下まき・6月上～6月下どり]

品 種 名	種 苗 会社名	特 性 一 覧							備 考
		早晩性	球形	球大小	球色	抽だい性	耐寒性	耐暑性	
ラ プ ト ル	ウエキ	極早生	やや扁平	大	緑	晩	やや強	-	形状安定性が高い。
バ ー ク レ ー	タキイ	早 生	球	中大	緑	やや晩	やや強	やや強	カルマー系より2～3割減肥する。
ク リ ス タ ル	カネコ	中早生	球	中	濃緑	-	強	-	早春まきの他、晩夏まき、秋まきトンネルにも適する。

(2)夏まき[8月上～8月下まき・10月上～11月下どり]

品 種 名	種 苗 会社名	特 性 一 覧							備 考
		早晩性	球形	球大小	球色	抽だい性	耐寒性	耐暑性	
ラ プ ト ル	ウエキ	極早生	やや扁平	大	緑	晩	やや強	-	形状安定性が高い。
ユ ー レ イ ク ス	みかど	早 生	球	中	緑	晩	-	強	高温結球性の優れた夏まき早どり用。
サ ウ ザ ー	タキイ	早 生	扁平	中	濃緑	晩	-	強	変形球が少ない。 PVP
キ ャ ス パ ー	ウエキ	早 生	豊円	大	緑	晩	-	強	高温期の結球安定性優れる。
ス プ リ ン グ W	ツルタ	早 生	豊円	大	濃緑	晩	やや強	-	高温期の結球安定性優れる。
ス プ リ ン グ	ツルタ	中早生	豊円	大	濃緑	晩	やや強	-	球形が安定し、球のしまりがやや遅い。
シ ス コ	タキイ	中 生	扁平	大	緑	中	-	中	8月中～下旬まきに適した多収性品種。

(3)秋まきトンネル[11月上～12月上まき・3月下～5月上どり]

品 種 名	種 苗 会社名	特 性 一 覧							備 考
		早晩性	球形	球大小	球色	抽だい性	耐寒性	耐暑性	
カ ル マ ー M R	カネコ	早 生	扁平	大	濃緑	-	強	-	葉肉厚く、食味の良い良質品種。春まきにも適する。
ス テ デ イ	ツルタ	中早生	やや扁平	中	濃緑	-	強	-	ステディノーマルと呼ばれる。
プ ラ ノ	住 化	中早生	やや扁平～豊円	大	濃緑	-	強	-	低温肥大性、耐寒性優れる。べと病に強い。3月どりに適している。
ツ ラ ラ	ツルタ	中 生	扁平～球	大	濃緑	-	強	弱	低温肥大性、耐寒性優れる。

2 リ ー フ レ タ ス

(1)春まき[3月上～5月下まき・5月中～7月下どり]

品 種 名	種 苗 会社名	特 性 一 覧				備 考
		葉の赤	葉の緑	抽だい性	葉のちぢみ	
レ ッ ド フ ァ イ ヤ ー	タキイ	中	-	中	多	色彩鮮やかな赤色系品種。
レ ッ ド ウ ェ ー ブ	サカタ	中	-	中	多	葉が大きく色彩鮮やかな赤色系品種。

(2)夏まき[8月中～8月上まき・10月上～10月下どり]

品 種 名	種 苗 会社名	特 性 一 覧				備 考
		葉の赤	葉の緑	抽だい性	葉のちぢみ	
レ ッ ド フ ァ イ ヤ ー	タキイ	中	-	中	多	夏まきで、色彩鮮やかな赤色系品種。

(3)秋まき[9月上～10月上まき・11月上～12月上どり]

品 種 名	種 苗 会社名	特 性 一 覧				備 考
		葉の赤	葉の緑	抽だい性	葉のちぢみ	
レ ッ ド フ ァ イ ヤ ー	タキイ	濃	-	晩	多	色彩鮮やかな赤色系品種。
レ ッ ド ウ ェ ー ブ	サカタ	濃	-	晩	多	赤色系、色彩良好で食味も良い。株は盛上る。

3 コスレタス・その他レタス類

(1) 夏まき[8月上～8月下まき・10月中～12月上どり]等

品 種 名	種 苗 会社名	特 性 一 覧					備 考
		早晩性	結球性	大きさ	葉色	作型適応性	
チマ・サンチュ (青葉種)	各社	早	非結球	中	濃緑	春～秋まき	かきチシャの品種で、耐暑性、耐寒性優れる。焼肉などを包んで食べる。
ラ・コスタ	カネコ	中	半結球	中	緑	春・夏まき	コスレタスの品種では甘みが強い。葉のねじれ少ない。

4 茎レタス

(1) 春まき[3月上まき・5月下～6月上どり]・
夏まき[7月下～8月下まき・9月中～11月中どり]

品 種 名	種 苗 会社名	特 性 一 覧						備 考
		草丈	葉型	葉色	茎径	花蕾の発生	分枝の発生	
ケルン	サカタ	40～ 50cm	細長	中緑	中	やや遅	やや多	空洞の発生が多いため適期収穫をする。

5 カリフラワー

(1) 夏まき秋どり[7月上～下まき・10月上～11月上どり]

品 種 名	種 苗 会社名	特 性 一 覧					備 考
		早晩性	花蕾量	花蕾色	苞葉性 ²⁾	耐暑性	
スノークラウン	タキイ	早生	850g	白	やや強	中	草勢強く、花蕾は肉厚。
パロック	サカタ	早生	900	白	やや強	中	草丈は低く、草姿はやや開張。
雪まつり	武蔵野	早生	800	白	強	強	草姿はやや立性で、草勢強。

(2) 夏まき冬どり[7月下～8月上まき・11月中～12月中どり]

品 種 名	種 苗 会社名	特 性 一 覧					備 考
		早晩性	花蕾量	花蕾色	苞葉性 ²⁾	耐暑性	
みせい星	サカタ	早生	350g	純白	強	極強	ミニカリフラワー。
ブライダル	サカタ	中早生	900	白	やや強	やや強	花蕾はよく張り、品質良。
輝月	野崎	中早生	850	純白	やや強	中	花蕾の盛り上がりよく、丸型で品質良。

(3) 冬まき初夏どり[1月中～2月中まき・5月中～6月上どり]

品 種 名	種 苗 会社名	特 性 一 覧					備 考
		早晩性	花蕾量	花蕾色	苞葉性 ²⁾	耐暑性	
スノークラウン	タキイ	早生	850g	白	やや強	中	花蕾発育期の気温が低すぎると、花蕾は赤色をおびる。

²⁾「強～やや強～やや弱～弱」で表示

6 カリフラワー有色種・ロマネスコ

(1) 夏まき秋・冬どり[7月中～8月上まき・11月～12月どり]

品 種 名	種 苗 会社名	特 性 一 覧				備 考
		早晩性	花蕾色	ゆで後の色	形状	
バイオレットクイン	タキイ	早生	濃紫	緑	プロッコリー型	頂花蕾約500g。
おれんじみせい美星	サカタ	早生	オレンジ	オレンジ	カリフラワー型	頂花蕾約350g。
オレンジブーケ	タキイ	中早生	オレンジ(クリーム)	-	カリフラワー型	頂花蕾約700g。
スパイラル	渡辺農事	中早生	黄緑	緑	らせん花蕾	ロマネスコ型。甘味強く食味良好。
パープルフラワー	武蔵野	中生	紫	淡青	カリフラワー型	お酢をかけるとピンク色になる。

7 ブロッコリー

(1) 早春まき[1月下～3月上まき・5月上～6月上どり]

品 種 名	種 苗 会社名	特 性 一 覧						備 考
		早晩性	草たけ	草姿	頂花蕾	側花蕾	花蕾色	
ハイ ツ S P	タキイ	中早生	中	やや立	大	少	濃緑	耐寒性、耐暑性強く、品質は安定。 べと病に強く、多収。
緑 嶺	サカタ	中早生	中	やや開	大	少	濃緑	

(2) 夏まき[7月中～8月中まき・10月上～12月下どり]

品 種 名	種 苗 会社名	特 性 一 覧						備 考
		早晩性	草たけ	草姿	頂花蕾	側花蕾	花蕾色	
ピ ク セ ル	サカタ	早生	中	やや開	中	少	濃緑	は種後90日タイプ。早生で品質良い。
す ば る	ブロード	早生	中	やや開	中	多	濃緑	95日タイプ。花蕾の品質良い。
お は よ う	サカタ	中早生	中	立	中	少	極濃緑	95日タイプ、花蕾の品質良い。地域限定品種。
フ ェ イ タ ー	ブロード	中早生	中～高	立	大	中	濃緑	95日タイプ。アントシアニン発生少ない。
緑 嶺	サカタ	中早生	中	やや開	大	少	濃緑	105日タイプ。べと病と黒腐病に強く、多収。
(新)緑 竜	ブロード	中早生	中	半開帳	大	少	濃緑	105日タイプ。根こぶ病耐病性。8月中旬播種で11月下旬～年内どりに向く。
グリー ンキャノン	サカタ	中生	中	立	大	少	濃緑	115日タイプ。根こぶ病抵抗性。8月上中旬まき、11月～12月どりに向く。
改 良 緑 炎	ブロード	中生	中	立	大	少	濃緑	120日タイプ。アントシアニン発生せず寒害受けにくい。
む つ み	ブロード	中生	やや低	立	中	少	濃緑	125日タイプで、12～1月どりに適する。
ア ー サ ー	ブロード	中生	中	やや開	大	少	濃緑	120日タイプ。アントシアニン発生せず。
(新)深 碧	ブロード	中生	中	半開帳	中	少	濃緑	120日タイプ。根こぶ病耐病性。アントシアニンの発生は比較的少ない。
グ ラ ン ド ー ム	サカタ	中晩生	中	やや立	大	少	濃緑	120日タイプで7月中～8月上旬まき、夏まき年内どりに向く。
エ ン デ バ ー SP	タキイ	晩生	—	立	中	少	濃緑	耐寒性にすぐれ、収穫期は12月～3月。

(3) 秋まき冬どり[9月上中まき・1月上～2月下どり]

品 種 名	種 苗 会社名	特 性 一 覧						備 考
		早晩性	草たけ	草姿	頂花蕾	側花蕾	花蕾色	
よ し みどり 美 緑 408	野崎採種場	中早生	—	立	大	少	濃緑	花蕾の形状よく、草型は立性。 120日タイプ。アントシアニン発生せず。 125日タイプ。アントシアニン発生は少ない。 120日タイプ。 アントシアinless。三浦半島の冬どりに適する。 耐寒性があり、三浦半島の冬どりに適する。 150日タイプ。べと病耐病性でアントシアニンの発生は少ない。
直 緑 93 号	ブロード	中生	中	立	大	少	濃緑	
ア ー サ ー	ブロード	中生	中	やや開	大	少	濃緑	
む つ み	ブロード	中生	中	やや立	中	少	濃緑	
り ん な	みかど	中生	—	極立	中	少	濃緑	
ク リ ア	ブロード	晩生	低～中	立	中	少	濃緑	
と も え	ブロード	晩生	中	立	中	少	濃緑	
ウ ィ ン タ ー ド ー ム	サカタ	晩生	—	立	大	少	濃緑	

(4) 茎ブロッコリー

春まき[2月～3月まき・5月～6月どり]、夏まき[7月～8月まき・10月下～12月どり]

品 種 名	種 苗 会社名	特 性 一 覧						備 考
		早晩性	草たけ	草姿	頂花蕾	側花蕾	花蕾色	
ス テ ィ ャ ッ ク セ ニ ョ ー ル	サカタ	極早	中	立	小	多	緑	耐暑性がある。茎がやわらかい。

8 パセリ

(1)初夏まき・冬どり[6月まき・11月～4月どり] / 秋まき・春夏どり[11月まき・5月～8月どり]

品 種 名	種 苗 会社名	特 性 一 覧				備 考
		葉 色	ちぢみ	葉柄長	葉柄太	
改良USパラマウント	ウエキ	濃緑	多	中	中	露地およびトンネル栽培用品種。
グランドパセリ	カネコ	濃緑	多	—	太	葉の縮みが強い多収品種。

9 セルリー

(1)露地栽培[6月上～6月中まき・11月中～11月下どり]

品 種 名	種 苗 会社名	特 性 一 覧					備 考
		葉姿	葉柄色	抽だい性	耐暑性	耐病性	
トップセラ	タキイ	立	淡緑	晩	中	中	草勢強く栽培しやすい。

(2)ハウス栽培[11月中～12月下まき・4月下～5月下どり]

品 種 名	種 苗 会社名	特 性 一 覧					備 考
		葉姿	葉柄色	抽だい性	耐暑性	耐病性	
コーネル 619	各社	中	黄白	中	やや弱	やや弱	厚肉で食味の良い良質品種。

10 アスパラガス

(1)雨よけハウス[4月上～5月中まき・4月上～9月どり]

品 種 名	種 苗 会社名	特 性 一 覧				備 考
		草勢	茎の太さ	茎枯病	さび病	
ウェルカム	サカタ	強	太	やや強	強	アントシアニンによる若茎の着色がやや目立つ。
スーパーウェルカム	サカタ	強	極太	やや強	強	

11 リーキ

(1)春まき[3月まき・11月～3月どり]

品 種 名	種 苗 会社名	特 性 一 覧				備 考
		早晩性	葉しよう太	葉しよう長	首のしまり	
ポワロ	タキイ	中生	中	長	良	年内どりに向く。1月下旬は表皮の変色に注意。
ポトフ・ルフレ	渡辺農事	中生	太	中	良	耐寒性が強く年明けどりに向く。3月どりは抽だいに注意。
リーク	藤田	晩生	中	中	良	葉しようの伸びが良く、寒さにも強い。

12 ルッコラ(ロケットサラダ)

(1)春～秋まき露地[4月上～10月中まき・5月上中～12月下どり]

品 種 名	種 苗 会社名	特 性 一 覧					備 考
		耐暑性	耐寒性	抽だい性	葉身色	早晩性	
オデッセイ	サカタ	中	中	低温時の播種注意	濃緑	早生	ピリッとした辛味とゴマの香りのあるサラダ用野菜。高温で乾燥すると食味が落ちるので、べたがけする。

(2)早春まきトンネル[2月中～3月下まき・4月上どり]

品 種 名	種 苗 会社名	特 性 一 覧					備 考
		耐暑性	耐寒性	抽だい性	葉身色	早晩性	
オデッセイ	サカタ	中	中	低温時の播種注意	濃緑	早生	低温期は発芽揃いと抽だいに注意。パイハウスでは周年で栽培可能。

IV 果 菜 類

1 キュウリ

(1) 半促成[12月中～1月中まき・3月上～6月下どり]

品 種 名	種 苗 会社名	特 性 一 覧						備 考
		草 勢	果 長	果色・光沢	イボの大きさ	イボの高さ	側 枝 ^{Z)}	
ハイ・グリーン 21	埼玉原種	強	短～中 (21)cm	濃緑・極 良	小	中	-	光沢のある果実で、収量高い。
マジカル 1 号	埼玉原種	強	短～中(21)	濃緑・極 良	小	やや高	多・中	草勢が良い。褐斑病に強い。枝動きは ゆっくりで「グリーンラックス」タイプ。
極 光 607	埼玉原種	強	短～中(21)	濃緑・極 良	小	やや高	多・中	褐斑病に強い。枝動きは「マジカル1号」 より多く、「ハイ・グリーン21」タイプ。
(新) ニーナ Z	埼玉原種	中	21～22	濃緑・良	中	中・強	中・中	褐斑病、うどんこ病に強く、主枝成り多 い。

(2) トンネル・露地[3月上～7月まき・5月中～9月中どり]

品 種 名	種 苗 会社名	特 性 一 覧						備 考
		草 勢	果 長	果色・光沢	イボの大きさ	耐寒性 ・耐暑性	側 枝 ^{Z)}	
大 望 I	ときわ	強	短～中 (21)cm	濃緑・良	小	-・強	多・中	耐病性・耐暑性強い。遅い作型向き。
と き わ 333	ときわ	強	中(22)	濃緑・良	小	中・中強	多・ 中～長	うどんこ病耐病性。早い作型向き。
夏 す ず み	タキイ	中強	短～中(21)	濃緑・極 良	小	中・強	中・ 中～長	べと病、うどんこ病に強く、秀品率高い。
パ イ ロ ッ ト	ときわ	強	中(22)	濃緑・良	小	中・中強	多・ 中～長	中長期の収量多い。うどんこ病に弱い。
南 極 1 号	ときわ	強	短～中(21)	濃緑・良	小	中・中強	多・ 中～長	うどんこ病に弱いが多収。
夏 ば や し	タキイ	強	21～22	濃緑・良	小	中・強	中多・ 中～短	べと病、うどんこ病に強い。

(3) 抑制[6月～7月まき・7月中～9月中どり]

品 種 名	種 苗 会社名	特 性 一 覧						備 考
		草 勢	果 長	果色・光沢	イボの大きさ	耐寒性 ・耐暑性	側 枝 ^{Z)}	
恵 の 風	埼玉原種	中	短～中(21)	濃緑・良	小	-・強	多・中	褐斑病に強く、果形が安定。
ゆ う み 637	埼玉原種	中	短～中(21)	鮮緑・良	小	-・強	中・中	褐斑病に強く、果形が安定。「恵の風」よ り主枝成り多い。
は や か	埼玉原種	中	21～22	濃緑・良	小	-・強	多・中	うどんこ病、褐斑病、べと病に強い。

(4) 抑制[7月上～8月中まき・9月上～12月中どり]

品 種 名	種 苗 会社名	特 性 一 覧						備 考
		草 勢	果 長	果色・光沢	イボの大きさ	耐寒性 ・耐暑性	側 枝 ^{Z)}	
エ ク セ レ ン ト エ 節 成 1 号	埼玉原種	中	短～中 (21)cm	濃緑・良	中	中・中強	中・中	弱光線・低温に適応。
エ ク セ レ ン ト エ 節 成 2 号	埼玉原種	中	短～中(21)	濃緑・良	中	中・強	中・中	強光線・高気温に適応性高い。
恵 の 風	埼玉原種	中	短～中(21)	濃緑・良	小	-・強	多・中	褐斑病に強く、果形が安定。
ズ バ リ 163	ときわ	強	中(21～22)	濃緑・中	中	中・強	多・中	側枝の着果が良好。
フ レ ス コ 100	久留米原育	中	中(22)	濃緑・良	中	中・強	中・中	べと病、褐斑病に強い。
エ ク セ レ ン ト 620	埼玉原種	強	短～中(20 ～21)	濃緑・良	中	-	多・長	褐斑病に強い。
か ね 兼 備 2 号	埼玉原種	強	中(21～22)	濃緑・良	中	-	多・中	うどんこ病、褐斑病、べと病に強い。主枝 成り少ない。
ク ラ ー ジ ュ	ときわ	中強	中(22)	濃緑・良	中	-・中	多・中	褐斑病、うどんこ病に強い。
ニ ー ナ Z	埼玉原種	中	21～22	濃緑・良	中	中・強	中・中	褐斑病、うどんこ病に強く、主枝成り多 い。

(5) 越冬[9月中まき・11月～2月どり]

品 種 名	種 苗 会社名	特 性 一 覧						備 考
		草 勢	果 長	果色・光沢	イボの大きさ	イボの高さ	側 枝 ^{z)}	
エクセレント節成1号	埼玉原種	中	短～中 (21)cm	濃緑・良	中	中	多・ 短～中	初期から秀品多い。
マジカル1号	埼玉原種	強	短～中 (21)	濃緑・極 良	小	やや高	多・中	初期から秀品多い。草勢強い。

z)「側枝」は、数(多中少)、長さ(長中短)で表示。

2 キュウリ台木

品 種 名	種苗会社名	特 性	備 考
ゆうゆう一輝	埼玉原種	つる割抵抗性、低温伸長性大。	「白タイプ」は早生性があり、「黒タイプ」は草勢が強い。
オールスター一輝	埼玉原種	つる割抵抗性、ブルーム発生抑制効果大。	胚軸太く接木が容易。(産地の主力品種)
ときわパワーZ2	ときわ	つる割抵抗性、ブルーム発生抑制効果大。	子葉もうどんこ病に強い。
NEWスーパー雲竜	久留米原種	つる割抵抗性、ブルーム発生抑制効果大。	胚軸太く接木が容易。
昇 竜	久留米原種	つる割抵抗性、ブルーム発生抑制効果大。	胚軸太く接木が容易。子葉大きく根量も多い。
黒 ダ ネ	各 社	つる割抵抗性、低温伸長性大。	低温伸長性は台木中最も強い。
ときわGT-II	ときわ	つる割抵抗性、ブルーム発生抑制効果大。	子葉もうどんこ病に強い。

3 トマト

(1) 促成・半促成 [9月中～11月上まき・2月中～7月中どり]

品 種 名	種 苗 会社名	特 性 一 覧										備 考	
		早晩性	草勢	果形	果色	果重	TMV	F ₁	J ₃	V	B		N
ハウス桃太郎	タキイ	極早生	中	豊円・腰高	桃	210g	Tm-2 ^a	○	×	○	×	○	完熟向き、食味良。
マイロック	サカタ	極早生	中	豊円・腰高	濃桃	200	Tm-2 ^a	○	×	○	△	○	完熟向き、食味良、葉かび病、F ₂ に抵抗性。
CF桃太郎はるか	タキイ	早生	中	豊円・腰高	桃	220	Tm-2 ^a	○	○	○	×	○	完熟向き、低温伸長性高い、早めの追肥が必要。(PVP)
麗 容	サカタ	早生	中強	豊円・腰高	濃桃	240	Tm-2 ^a	○	○	○	×	○	着果良く、玉伸びする。
桃太郎ヨーク	タキイ	早生	中	豊円・腰高	桃	230	Tm-2 ^a	○	○	○	×	○	完熟向き、葉かび病、F ₂ に抵抗性。
桃太郎ホープ	タキイ	早生	中	豊円・腰高	桃	220	Tm-2a	○	○	○	×	○	黄化葉巻病耐病性、低温期でも着果・肥大良好。(PVP)
れ い き 妃	サカタ	早生	中	豊円・腰高	赤	240	Tm-2a	○	○	○	×	○	黄化葉巻病耐病性。極硬玉で裂果少ない。葉かび病抵抗性 (cf9)。
は れ ぞ ら	みかど	早生	中強	豊円	濃桃	220	Tm-2 ^a	○	×	○	△	○	黄化葉巻病耐病性。葉かび病抵抗性 (cf9)、F ₂ に耐病性。裂果少ない。
サンロード	サカタ	中生	強	豊円・腰高	濃桃	250	Tm-2 ^a	○	○	○	△	○	完熟向き、食味良、大果系。

◎Tm-1, -2, -2a; TMV抵抗性因子、F1; 萎凋病レース1、F2; 萎凋病レース2、J3; 根腐萎凋病、V; 半身萎凋病、B; 青枯病、N; ネコブセンチュウ (次項以降も同様)

(2) トンネル・露地 [1月中～2月下まき・6月上～9月中どり]

品 種 名	種 苗 会社名	特 性 一 覧										備 考	
		早晩性	草勢	果形	果色	果重	TMV	F ₁	J ₃	V	B		N
桃太郎ファイト	タキイ	早生	やや強	豊円・腰高	桃	210g	Tm-2 ^a	○	○	○	△	○	葉かび病、斑点病、F ₂ に抵抗性。
桃 太 郎 8	タキイ	早生	強	豊円	桃	220	Tm-2 ^a	○	×	○	△	○	完熟向き、食味良。斑点病、F ₂ に抵抗性。
麗 夏	サカタ	早生	強	豊円	濃桃	220	Tm-2 ^a	○	×	○	×	○	葉かび病、斑点病、F ₂ に抵抗性。極硬玉で裂果に強い。
麗 旬	サカタ	早生	中	豊円腰高	赤	230	Tm-2a	○	○	○	×	○	黄化葉巻病耐病性。極硬玉で裂果少ない。葉かび病抵抗性 (cf9)。
サンロード	サカタ	中生	強	腰高	桃	220	Tm-2 Tm-1	○	○	○	△	○	完熟向き、食味良。すじ腐れに注意。

(3) 抑制 [6月下～7月下まき・10月中～1月下どり]

品 種 名	種 苗 会社名	特 性 一 覧										備 考	
		早晩性	草勢	果形	果色	果重	TMV	F ₁	J ₃	V	B		N
マイロック	サカタ	極早生	中	豊円・腰高	濃桃	200g	Tm-2 ^a	○	×	○	△	○	完熟向き、食味良。促成、半促成でも使用可。
りんか 409	サカタ	極早生	中	豊円・腰高	桃	240	Tm-2 ^a	○	-	○	-	○	完熟向き、食味極良。促成、半促成も可。
桃太郎ピース	タキイ	早生	中	豊円・腰高	濃桃	210～220	Tm-2 ^a	○	○	○	×	○	黄化葉巻病耐病性。葉かび病抵抗性 (cf9)、F ₂ に抵抗性。(PVP)
TYみそら 86	みかど	早生	中	豊円・腰高	濃桃	220	Tm-2 ^a	○	-	○	△	○	黄化葉巻病耐病性。葉かび病抵抗性 (cf9)、F ₂ に抵抗性。裂皮がやや多い。
麗 旬	サカタ	早生	中	豊円・腰高	赤	220～230	Tm-2a	○	○	○	×	○	黄化葉巻病耐病性。極硬玉で裂果少ない。葉かび病抵抗性 (cf9)。
ありさ 014	朝日アグリ	早生	中	豊円・腰高	濃桃	220	Tm-2a	○	○	○	×	○	黄化葉巻病耐病性。極硬玉で裂果少ない。葉かび病抵抗性 (cf9)。
れ い き 妃	サカタ	早生	中	豊円・腰高	赤	240	Tm-2a	○	○	○	×	○	黄化葉巻病耐病性。極硬玉で裂果少ない。葉かび病抵抗性 (cf9)。
は れ ぞ ら	みかど	早生	中強	豊円	濃桃	220	Tm-2 ^a	○	×	○	△	○	黄化葉巻病耐病性。葉かび病抵抗性 (cf9)、F ₂ に耐病性。裂果少ない。

(4) 抑制長期 [6月下～7月下まき・10月中～6月下どり]

品 種 名	種 苗 会社名	特 性 一 覧											備 考			
		早晩性	草勢	果形	果色	果重	TMV	F ₁	J ₃	V	B	N				
麗 旬	サカタ	早生	中	豊円・腰高	赤	220～230	Tm-2a	○	○	○	×	○	○	○	○	黄化葉巻病耐病性。極硬玉で裂果少ない。葉かび病抵抗性 (cf9)。
桃太郎ピース	タキイ	早生	中	豊円・腰高	濃桃	210～220	Tm-2 ^a	○	○	○	×	○	○	○	○	黄化葉巻病耐病性。葉かび病抵抗性 (cf9)、F ₂ に抵抗性。
TYみそら109	みかど	早生	中	豊円・腰高	濃桃	200	Tm-2 ^a	○	×	○	○	△	○	○	○	黄化葉巻病耐病性。葉かび病抵抗性 (cf9)、F ₂ に抵抗性。果実が硬い。

4 ミニトマト・中玉トマト

(1) ミニトマト

品 種 名	種 苗 会社名	特 性 一 覧											備 考			
		早晩性	草勢	果形	果色	果重	TMV	F ₁	J ₃	V	B	N				
キャロル10	サカタ	極早生	中強	豊円	赤	15～20g	Tm-2	○	×	×	×	○	○	○	○	割れにくく、着色がよい。葉かび病抵抗性。
イエローミミ	カネコ	極早生	中強	豊円	黄	15	Tm-2 ^a	○	×	×	×	×	○	○	○	高糖度で食味極良。
TY千果	タキイ	極早生	中強	球	濃赤	15～20	Tm-3 ^a	○	○	—	—	○	○	○	○	黄化葉巻病に耐病性。葉かび病 (cf9) に耐病性、裂果しにくい。PVP
アイコ	サカタ	早生	中強	プラム	赤	18～25	Tm-2 ^a	○	○	×	×	×	○	○	○	高糖度で裂果しにくい。
ラブリーさくら	みかど協和	早生	中強	豊円	赤	15～20	Tm-2 ^a	○	○	○	×	○	○	○	○	高糖度でうまみ強く、食味良い。
恋 味	ナント	やや晩生	中	豊円	濃赤	15～18	Tm-2 ^a	○	×	○	×	○	○	○	○	高糖度で食味に優れ直売向き。

(2) 中玉トマト促成 [10月上～11月上まき・2月上～7月下どり]

品 種 名	種 苗 会社名	特 性 一 覧											備 考			
		早晩性	草勢	果形	果色	果重	TMV	F ₁	J ₃	V	B	N				
フルティカ	タキイ	早生	やや強	球	濃赤	30～50g	Tm-2 ^a	×	×	×	×	○	○	○	○	斑点病と葉かび病レース9まで抵抗性を持つ。裂果しにくく、抑制栽培にも適する。PVP
レッドオーレ	カネコ	早生	中～強	球	濃赤	40～50	Tm-2	○	×	×	×	○	○	○	○	斑点病に抵抗性を持つ。
カンパリ	ベスト クropp	早生	やや弱	球	濃赤	40～50	Tm-2 ^a	○	○	○	×	○	○	○	○	糖度・酸度が適度で食味良好。房どりができる。
ルネッサンス	サカタ	晩生	やや弱	腰高球 先尖る	桃	150	Tm-2 ^a	○	○	×	×	×	○	○	○	中～大球で肉質・食味良好。単為結果性で着果安定。

5 生食・加熱調理兼用トマト

(1) 露地/施設

品 種 名	種 苗 会社名	特 性 一 覧											備 考			
		早晩性	草勢	果形	果色	果重	TMV	F ₁	J ₃	V	B	N				
湘南ポモロンド レ ッ ト	県種苗協	早生	やや強	長円筒	濃桃	60～80g	Tm-2 ^a	○	×	○	×	×	○	○	○	中玉、基肥量は大玉品種よりも30%制限する。草姿がスリムなため、密植 (3000株/10a) が可能。
湘南ポモロンド ゴ ー ル ド	県種苗協	早生	やや強	長円筒	橙黄	60～80	Tm-2 ^a	○	×	○	×	×	○	○	○	

6 調理用トマト

(1) 露地 [2月中～3月まき・7月下～8月中どり]

品 種 名	種 苗 会社名	特 性 一 覧											備 考
		早晩性	草勢	果形	果色	果重	TMV	F ₁	J ₃	V	B	N	
シシリアン ルー ジュ	パイオニア	早生	中～強	プラム	濃赤	20～30g	Tm-1	○	×	○	×	×	着果性はミニトマトに近い。
なつのこま	大和	中生	中	プラム	濃赤	40～50	×	○	×	○	×	×	芯止まり。ジョイントレス果柄。輪紋病抵抗性がやや高い。一斉収穫型。

7 トマト台木

(1) 接木栽培

品 種 名	種 苗 会社名	特 性 一 覧										備 考
		Tm因子	草勢	F ₁	F ₂	F ₃	J ₃	V	B	K	N	
ヘルパー M	タキイ	Tm-1	やや弱 ～中	○	○	×	×	○	○	×	○	Tm-1型品種専用。草勢おとなしい。
ブ ロ ッ ク	サカタ	Tm-2 ^a	やや強	○	○	○	○	○	○6	○6	○	萎ちょう凋病レース3抵抗性。
マ グ ネ ッ ト	サカタ	Tm-2 ^a	強	○	○	×	○	○	○5	○6	○	
ボ ラ ン チ	タキイ	Tm-2 ^a	やや弱	○	○	×	○	○	○9	○3	○	青枯病とコルキールート同時発生ほ場での利用が有効。
B バ リ ア	タキイ	Tm-2 ^a	やや弱	○	○	×	○	○	○9	×1	○	草勢はおとなしいが青枯病には特に強い。
ス パ イ ク	愛 三	Tm-2	中～や や強	○	○	×	○	○	△5	○9	○	前半から草勢強い。低温管理や乾燥しやすいほ場に向く。
グ リ ー ン セ ー プ	タキイ	Tm-2 ^a	中	○	○	○	○	○	○9	○7	○	(PVP)
フ レ ン ド シ ッ プ	サカタ	Tm-2 ^a	中	○	○	×	○	○	○7	○9	○	コルキールートに強く、青枯病も強い。
グ リ ー ン フ ォ ー ス	タキイ	Tm-2 ^a	やや強	○	○	○	○	○	○8	○7	○	生育初期から後半まで草勢が強い。 (PVP)
バ ッ ク ア タ ッ ク	サカタ	Tm-2 ^a	やや強	○	○	○	○	○	○8	○6	○	生育初期から後半まで草勢が強い。半身萎凋病レース2を保有。

©Tm-1, -2, -2^a; TMV抵抗因子、F₁, F₂, F₃; 萎凋病レース1, 2, 3、J₃; 根腐萎凋病、V; 半身萎凋病、B; 青枯病、K; 褐色根腐病、N; ネコブセンチュウ、耐病性の程度：弱1←→10強

8 ナ ス

(1) 露地 [2月中～3月中まき・6月中～10月下どり]

品 種 名	種 苗 会社名	特 性 一 覧								備 考
		早晚生	草勢	草姿	収量性	果形	果重	果色	肉質	
千 両 二 号	タキイ	極早生	強	中開	極多	長卵	100～ 120g	濃黒紫	良	石ナスや夏ボケ少ない。 果実のヘタや茎葉にトゲがない。 PVP 色つや良く初期収穫量多い。 単為結果性で果形が安定し、石ナス が極めて少ない。 PVP 元肥は少なめにし、追肥を多くす る。 田楽に最適。 肉質が柔らかく、焼ナスに最適。 極多汁質でサラダ用に最適。 PVP
とげなし千両二号	タキイ	極早生	中強	中開	極多	長卵	100～ 120	濃黒紫	良	
筑 陽	タキイ	極早生	中強	中開	極多	太長	100～ 120	濃黒紫	良	
あ の み の り 2号	ノウリン 渡辺採種	極早生	中強	中間	多	長卵	120～ 150	濃黒紫	良	
千 黒 2 号	武蔵野	早生	強	中開	極多	中長	100～ 120	濃黒紫	良	
早 生 大 丸	タキイ	中早生	強	中開	多	丸	250～ 300	黒紫	良	
庄 屋 大 長	タキイ	中早生	強	立性	中	極長	200～ 250	黒紫	良	
サ ラ ダ 紫	県種苗協	中生	強	立性	多	巾着	120～ 150	黒紫	良	

9 ナ ス 台 木

品 種 名	種 苗 会社名	特 性 一 覧								備 考
		低温 伸長性	播種日 Z)	草勢	早期収 量	総収量	B	V	F	
トルバムビガー	各 社	中	20～30 日早	極強	少	多	○	○	○	初期生育おそい。
ト ナ シ ム	タキイ	中	12～14 日早	強	多	多	○	○	○	ネコブセンチュウにも強い。

Z) 穂木と比較した播種日、 B;青枯病、V;半身萎凋病、F;半枯病

10 ピ ー マ ン

(1) 露地 [2月中まき・6月中～10月下どり]

品 種 名	種 苗 会社名	特 性 一 覧							備 考
		早晚性	草勢	節間	果形	果重	果色	果肉厚	
京 波	タキイ	—	強	—	中型	30g	濃緑	やや厚	食味良好で直売向き。
み お ぎ	園 研	—	強	長	中型	40～50	濃緑	—	硬くなりにくく、肥大が早い。
あ き の	サカタ	早生	強	中	中型	40	濃緑	中厚	TMVに強い。濃緑で光沢がある。

11 カラーピーマン (パプリカ)

(1) 雨よけハウス [2月中まき・6月中～12月下どり] 三浦

品 種 名	種 苗 会社名	特 性 一 覧							備 考
		早晚性	草勢	節間	果形	果重	果色	果肉厚	
フ ェ ア ウ エ イ	ベスト クローブ	極早生	強	中	中獅子	140～ 190g	濃緑～黄色	厚	果実そろいよい。旧名フィエスタ。
ス ペ シ ャ ル	ベスト クローブ	極早生	中	中	中獅子	150～ 190	濃緑～赤色	厚	品種安定。
セ ニ ョ リ ー タ ビ	サカタ	早生	中	中	扁平	50～60	赤	中	黄、橙品種もある。
パ プ リ コ ッ ト ^R 赤	デルモンテ	早生	中～弱	中	短く さび	80	赤	薄	CMVワクチン接種苗で販売、糖度 高め、黄品種もある。
ワ ン ダ ー ベ ル	タキイ	中早生	中	中	中獅子	150	濃緑～赤色	厚	収穫時期を通じて収量性が安定。

12 カボチャ

(1) トンネル露地 [2月中～4月上まき・6月中～8月下どり]

品 種 名	種 苗 会社名	特 性 一 覧							備 考
		早晩性	果皮色	果肉色	収量性	果重	花落径	肉質 ²⁾	
バターナッツ	タキイ	極早生	黄褐色	濃黄色	多	0.8程度	—	粘	交配後30日程度で収穫可
みやこ	サカタ	早生	濃緑色	濃黄色	中	1.2kg程度	小	粉	草勢は「えびす」よりおとなしい。
坊ちゃん	みかど	早生	濃緑色	濃黄色	多	0.5程度	—	強粉	ミニカボチャ。
ほっとけ栗たん	渡辺採種	早生	濃緑色	濃黄色	多	1.2程度	極小	強粉	5月まきまでなら、極短節間なので密植できる。
えびす	タキイ	中生	濃緑色	濃黄色	多	1.5程度	大	やや粘	花落径が大きいため、外観やや劣る。
九重栗	カネコ	中生	濃緑色	淡黄色	—	1.8～2.0	—	強粉	開花後熟期45～50日。
白い九重栗	カネコ	中晩生	白色	淡黄色	多	2.0～2.5	—	強粉	開花後熟期50～55日。今までにない粉質で食味良い。
雪化粧	サカタ	中晩生	灰白色	淡黄色	—	2.3程度	—	強粉	開花後熟期50～55日。1ヵ月程度の貯蔵期間をおくこと。

2) 「強粉～粉～やや粘～強粘」で表示。

13 トウガン

(1) 露地 [3月中～4月下まき・7月中～9月下どり]

品 種 名	種 苗 会社名	特 性 一 覧								備 考
		早晩性	収量性	果重	果長	果径	果皮色	果肉色	ブルーム ²⁾	
姫とうがん	タキイ	早生	多	1.5～2.0kg	20～25cm	13～15cm	濃緑色	白色	少	早播きではマルチ、べたがけをする。
華枕	八江	早生	多	1.5～2.0	20～25	13～15	濃緑色	淡黄色	少	同上

2) ブルームは果面に生じる白色のろう物質

14 オクラ

(1) 露地 [4月下まき・7月上～9月下どり]

品 種 名	種 苗 会社名	特 性 一 覧								備 考
		早晩性	草丈	節間長	葉の大きさ	分枝性	果の長さ	果の稜角	果の色	
スターライト	武蔵野	極早生	中	中～短	中小葉	中	10	5角・星	濃緑	イボ果は少ない。
グリーンソード	タキイ	極早生	中	—	中葉	中	8	5角	濃緑	イボ果は少ない。
ピークファイブ	サカタ	早生	中	短	—	—	—	5角	濃緑	
まるみちゃん	タキイ	早生	中	長	中葉	中	10	丸	緑	草勢が強く、収穫適期が長い。通販品種。

15 シシトウ

(1) 露地 [2月下まき・7月上～10月下どり]

品 種 名	種 苗 会社名	特 性 一 覧								備 考
		草勢	草姿	節間	葉の大小	早晩性	果形	果色	低温性	
すい翠	サカタ	強	杯状	短	小	早生	土佐しし	鮮緑	強	果梗は短い。
東京ししとう	武蔵野	強	半開	中	小	早生	小型(中)	鮮緑	強	青枯れ病の耐病性大。

16 ズッキーニ

(1) トンネル [3月上まき・5月下～7月下どり]

品 種 名	種 苗 会社名	特 性 一 覧						備 考
		果皮色	果形	果肉色	肉厚	着果性	草勢	
ダイナー	タキイ	濃緑	円筒	黄白	厚	節成	強	ブッシュ状、開花後4日で収穫適期。
オーラム	タキイ	濃黄	円筒	黄白	厚	節成	強	ブッシュ状、開花後4日で収穫適期。
グリーンポート2号	カネコ	濃緑	円筒	白	厚	節成	強	ズッキーニ黄斑モザイクウイルスおよびカボチャモザイクウイルスに強く多収性。
イエローポート	カネコ	濃黄	円筒	白	厚	節成	強	ズッキーニ黄斑モザイクウイルスに強い。
モスグリーン	ナント	濃緑	円筒	白	厚	節成	強	節間が短く、尻太果、曲がり果が少ない。

17 スイートコーン

(1) トンネル・露地 [3月下～4月下まき・6月下～7月下どり]

品 種 名	種 苗 会社名	特 性 一 覧							備 考
		早晚性	粒色	収穫日数	雌穂重	雌穂長	粒列	草丈	
ゴールドラッシュ	サカタ	早生	黄	83 ～84日	360g	28cm	16～20	170～180 cm	「ゴールドラッシュ」よりしなびが遅い。先端の粒が着色してから収穫する。
ゴールドラッシュ86	サカタ	中生	黄	86	410	30	16～20	170	
味来390	朝日アグリア	中生	黄	86	350	25	16～18	210	
ゆめのコーン	サカタ	中生	黄・白	87日	360	29	16～20	175	
ピュアホワイト	雪印	中生	白	88～90	380	20	19	140	

(注) 粒色の異なる品種間の交雑を避ける。

(2) 露地抑制 [8月上～中まき・11月上どり]

品 種 名	種 苗 会社名	特 性 一 覧							備 考
		早晚性	粒色	収穫日数	雌穂重	雌穂長	粒列	草丈	
グラビス	雪印	中早生	黄・白	85日	—	28cm	—	—	甘み強く、食味評価高い。
ピュアホワイト	雪印	中生	白	85～87	—	24	—	—	多収で食味もよい。
おひさまコーン88	タキイ	中生	黄	88	420g	31	16～20	200cm	イエロー系品種 甘み強 粒皮軟
おおももの	ナント	中生	黄	88	500	—	19前後	190	イエロー系品種 穂重大
サニーショコラ	みかど	中生	黄	90	—	23	—	—	イエロー系品種 甘み強い
ゴールドラッシュ90	サカタ	中晩生	黄・白	90	410	30	16～18	180～200	先端不稔が少なく、食味がよい。また、倒伏しにくい。
ピーター610	サカタ	晩生	黄・白	93	400	30	16～18	210	

(注) 粒色の異なる品種間の交雑を避ける。

18 ニガウリ

(1) 露地〔3月上～中まき・7月～10月上どり〕

品 種 名	種 苗 会社名	特 性 一 覧			備 考
		果皮色	果 長	果 重	
え ら ぶ	八 江	濃緑	30cm前後	300g前後	

V 果実的野菜

1 イチゴ

(1)促成[9月上～9下定植・11月中～5月下どり]

品 種 名	(育成者)	特 性 一 覧							育成者 権期限	備 考
		早晩性	草勢	果形	果色	果重	Brix	収量性 ²⁾		
とちおとめ	栃木県	早生	強	短円錐	鮮紅	20g	11%	650g	—	大果で食味良い。
章 姫	萩原章弘	早生	ごく強	長円錐	鮮紅	18	10	975	—	大果で収量性が高い。果実は柔らかい。
紅 ほ っ べ	静岡県	早生	強	短円錐	鮮紅	20	11	800～900	2022年	「章姫」×「さちのか」の後代で、中間的特性を持つ。(PVP)
おいCベリー	農研機構	早生	強	短円錐	鮮紅	20	11	740	2032年	大果で食味良い。栽培はさちのかに準ずる。(PVP)
さちのか	野茶研	中生	強	短円錐	鮮紅	20	11	650	2020年	果実が硬く、大果で食味良い。うどんこ病に弱い。
やよいひめ	群馬県	中生	強	円錐	明紅	20	11	770	2025年	開花が遅いが、大果で後半も果実が硬い。(PVP)

2)収量性、1株当り 全期間

(2)露地[10月上～10下定植・5月中～6月中収穫]

品 種 名	(育成者)	特 性 一 覧							備 考	
		早晩性	草勢	果形	果色	果重	Brix	収量性 ²⁾		
宝 交 早 生	兵庫県	中晩生	やや強	くさび	鮮紅	10g	8%	300g		うどんこ病に強い、食味も良い。

2)収量性、1株当り 全期間

2 スイカ

(1)トンネル早熟[2月中～3月上まき・4月上～4月中定植・7月上～7月下どり]

品 種 名	種 苗 会社名	特 性 一 覧							備 考	
		早晩性	草勢	成熟日 数 ²⁾	果形	果皮色	果肉色	果重		
(大玉)										
金 時	嶋 崎	中生	中	45～50日	球	やや濃 緑	桃紅	6.0～7.0kg		収量性高い。肉質ややかため。日持ちよい。
富 士 光 T R	萩 原	中生	中	約45	球	緑	鮮紅	6.0～7.0		低温期の生育良。肉質ややかため。日持ちよい。
祭りばやし 777	萩 原	中生	中	46～50	豊円	中濃緑	鮮桃紅	7～8		空洞果になりにくい。
祭ばやし 777-11	萩 原	中生	強	50	豊円	中濃緑	鮮桃紅	8～9以上		糖度12～13%。肉質ややかため。
紅 ま く ら	タキイ	中生	中強	48～50	枕形	濃緑	濃桃紅	7～8		糖度12～13%。大玉、枕形品種。
(小玉)										
姫 ま く ら	丸 種	早生	強	33～35	楕円	濃緑	鮮紅	2.0～2.5		ラグビーボール型。シャリ感ある。
姫 甘 泉	丸 種	早生	中	35	腰高	緑	鮮紅	2.5～3.0		小玉では高糖度でシャリ感ある。
マダーボール	みかど協和	早生	強	36～40	楕円	濃緑	桃紅	2.0		糖度高い。ラグビーボール型。
お お と り 2 号	トーホク	早生	中	40	高円	緑	黄	2.0～2.5		クリーム系統で糖度高い。

2)開花～収穫までの日数

3 スイカ用台木

(1)トンネル早熟[2月中～3月上まき・4月上～4月中定植・7月上～7月下どり]

品 種 名	種 苗 会社名	特 性 一 覧				備 考
		草 勢	早晩性	果肉質	低温伸長性	
かちどき2号 (ユウガオ)	萩原	強	中生	普通	強	急性萎ちよう症発生は場は不適。
ライオン冬瓜 (トウガン)	ナント	やや弱	やや晩生	やや軟	やや弱	急性萎凋症状が発生しにくい。定植初期の低温伸長やや劣る。育苗期はユウガオより、多少高温管理をする。
強剛 (スイカ)	サカタ	中	やや晩生	良	弱	定植初期の低温伸長性がやや劣る。つぎ木にやや難、品質良い。

4 メロン

(1)半促成[2月下～3月中まき・6月下～7月中どり]

品 種 名	種 苗 会社名	特 性 一 覧							備 考
		成熟 日数z)	果重	果形	果皮色	果肉色	Brix	耐病性 y	
アールスセイヌⅡ 春	八江	55日	1.5～1.7kg	正球	灰白	黄緑	14～16%	P・F	草勢強く着果性、ネット発現良。
アールスセイヌⅡ 夏	八江	55	1.3～1.6	高球	灰緑	黄緑	14～16	P・F	茎が太くなると高球になり易い。
アールスナイト 夏系2号	サカタ	55	1.3～1.6	高球	灰緑	黄緑	14～16	P・F	} ネット発現良く、アールスに近い外観。
アールスナイト 春秋系	サカタ	55	1.4～1.6	高球	灰緑	黄緑	14～16	P・F	
ベネチア夏Ⅱ	八江	55	1.6～1.8	正球	灰白	黄緑	14～16	F	短節間で草勢が強い。
ミラノ夏Ⅰ	八江	55	1.3～1.6	正球	灰白	黄白緑	14～16	P・F	うどんこ病に強く、えそ斑点病抵抗性。

z) 成熟日数=開花～収穫までの日数、y;耐病性は、Pうどんこ病、Fつる割れ病 (以下の作型も同様)

(2)トンネル早熟[2月中～3月上まき・6月下～7月中どり]

品 種 名	種 苗 会社名	特 性 一 覧							備 考
		成熟 日数z)	果重	果形	果皮色	果肉色	Brix	耐病性 y	
キンショー	スペイン	30～35 日	0.7～1.2kg	楕円	黄色	白色	14～16	-	着果過多にすると、しおれが出易い。
久留米交配4号	タキイ 八江	45～50	1.2～1.5	正球	灰緑	淡緑	14～15%	P・F	裂果しやすいので水管理に注意する。
クインシー	ウエキ	55	1.5～1.7	正球	灰緑	明橙	15～17	P・F	赤肉メロン、ネット低いのが食味良。
ハピネス	丸種	55～58	1.6～1.8	正球	灰緑	緑	15～16	P・F	雌花開花と着果が安定している。
タカミ	園研	55～60	1.2～1.5	高球	灰緑	緑	15～16	P・F	ネットの盛りは低いのが、食味優れている。

(3)抑制[7月下～8月中まき・10月中～11月上どり]

品 種 名	種 苗 会社名	特 性 一 覧							備 考
		成熟 日数z)	果重	果形	果皮色	果肉色	Brix	耐病性 y	
アールスナイト 春秋系	サカタ	55日	1.4～1.6kg	高球	灰緑	黄緑	13～16%	P・F	ネット発現良く、アールスに近い外観。
アールスナイト 早春晩秋系	サカタ	55	1.4～1.6	高球	灰緑	黄緑	14～16	P・F	草勢強くネットの発現良い、食味良。

Ⅵ 豆 類

1 エンドウ

(1) 秋まき[10月下～11月上まき・5月下～6月下どり]

品 種 名	種 苗 会社名	特 性 一 覧							備 考	
		早晚性	耐寒性	耐病性	草 丈	収量性	花色	莢の特徴		
(きぬさや系)					cm					
あずみ野 30 日 絹 莢 P M R 白 星	サカタ	極早生	中	中	80～90	中	白	すじあり小	うどんこ病に強い。	
赤花鈴成砂糖	松永	早生	強	中	80～90	中	白	すじあり小	分枝多く、下位節より収穫可。	
	松永	中生	強	中	80～90	中	濃赤	すじあり小	市場では「砂糖エンドウ」と称される。	
(大さや系)										
かわな大莢 P M R	サカタ	早生	中	中	140	大	淡赤	すじあり大	うどんこ病に強い。	

(2) 秋・春まき[10月下まき・5月下どり、2月下まき・6月上どり]

品 種 名	種 苗 会社名	特 性 一 覧							備 考
		早晚性	耐寒性	耐病性	草 丈	収量性	花色	莢の特徴	
(スナップ系)					cm				
スナック 7 5 3	サカタ	中早生	やや強	中	170～ 180	大	白	すじあり中	分枝多く、下位節より収穫可。
ス ナ ッ ク	サカタ	中生	やや弱	中～強	160～ 200	大	白	すじあり中	立枯れ病(レース1)抵抗性

2 インゲンマメ

(1) 露地[4月中～5月中まき・6月中～8月中どり]

品 種 名	種 苗 会社名	特 性 一 覧								備 考
		草 丈	花 色	成熟日 数 ^{z)}	莢 型	莢 長	莢 色	す じ	曲がり	
(つるなし)		cm		日		cm				
サクサク王子	サカタ	43	白	50	丸莢	17	濃緑	無	極少	歯切れ良く、良食味で、収量性高い。
つるなしモロッコ	タキイ	45	白	50	平莢	14	濃緑	無	無	極早生種、つるあり種もある。
さつきみどり2号	タキイ	40	白	54	丸莢	15	濃緑	無	少	高温期は減肥とする。甘味あり良食味。
つるなし ジャンピーノ	サカタ	40	薄桃	55	平莢	14～15	緑	無	少	平莢では「モロッコ」より肉厚で歯切れ良い。
(つるあり)										
ケンタッキー ワンダー	各社	2m以上	白	65	丸莢	23～25	濃緑	無	少	さび病に強く豊産性。
(半つる性)										
スーパーステイヤー	みかど協和	1.8～ 2.0	白	60	丸莢	15	濃緑	無	少	耐暑性強、多収性、かん水により増収。

(2) 露地[7月上～8月上まき・8月下～10月下どり]

品 種 名	種 苗 会社名	特 性 一 覧								備 考
		草 丈	花 色	成熟日 数 ^{z)}	莢 型	莢 長	莢 色	す じ	曲がり	
(つるあり)				日		cm				
ケンタッキー 101	タキイ	2m以上	白	63	丸莢	21～23	濃緑	無	少	揃い良く豊産性。
ケンタッキー ワンダー	各社	2m以上	白	65	丸莢	23～25	濃緑	無	少	さび病に強く豊産性。

z)は種～収穫までの日数

3 エダマメ

(1)トンネル[2月下～3月中まき・6月上～6月下どり]

品 種 名	種 苗 会社名	特 性 一 覧							備 考
		早晩性	成熟日 数 ^{z)}	草 丈	着莢性	莢 色	莢の特徴	三粒莢 率	
つ 月 夜 ね 音	雪 印	極早生	75～ 80日	45cm	密	淡緑	白毛・中	中	甘味強く食味が良い。低温着莢性良い。高温多湿でうどんこ病に注意する。
きや 莢 ね 音	雪 印	極早生	85～90	40	密	緑	白毛・大	中	早生で大莢。草丈が伸びにくいので、生育前半温度をかける。移植栽培では定植を遅れないようにする。 (PVP)
お つ な 姫	サカタ	早生	80	55	密(良)	淡緑	白毛・中大	大	茶豆風味の直売向け品種。
ユ キ ム ス メ	雪 印	中早生	80～85	45	密	淡緑	白毛・中	中	食味・外観が優れる。ハウスでも可。

(2)露地[4月上～4月中まき・7月上～7月中どり](移植)

品 種 名	種 苗 会社名	特 性 一 覧							備 考
		早晩性	成熟日 数 ^{z)}	草 丈	着莢性	莢 色	莢の特徴	三粒莢 率	
玉 す だ れ	ノウリン	極早生	80～ 85日	50cm	密	鮮緑	白毛・大	多	三粒莢率高い(40～45%)。トンネルでも可。
天 ケ 峰	サカタ	極早生	82～87	50	密	鮮緑	白毛・中	多	束出荷・手もぎに適する。トンネルでも可。
サ ッ ポ ロ ミ ド リ	雪 印	極早生	85～90	48	密	鮮緑	白毛・中	多	束出荷向き・県内の主要品種。トンネルでも可。
きや 莢 ね 音	雪 印	極早生	85～90	40	密	緑	白毛・大	中	早生で大莢。 (PVP)
サ ヤ ム ス メ	雪 印	中早生	84～	65	密	鮮緑	白毛・大	多	収穫適期の幅が広い。トンネルでも可。

(3)露地[4月下～5月中まき・7月中～8月中下どり](じかまき)

品 種 名	種 苗 会社名	特 性 一 覧							備 考
		早晩性	成熟日 数 ^{z)}	草 丈	着莢性	莢 色	莢の特徴	三粒莢 率	
湯 あ が り 娘	カネコ	中早生	70～ 80日	50～ 60cm	密	鮮緑	白毛・大	多	茶豆風味で白みがあり、食味良い。 (PVP)
恋 姫	雪 印	中早生 ～中生	70～80	65～75	やや密	鮮緑	白毛・大	中～多	茶豆系。 (PVP)
夕 涼 み	サカタ	中生	70	50	密	濃緑	白毛・大	多	茎が太く倒伏しにくい。
東 北 早 生 み ど り	トーホク	中生	80	40	密	鮮緑	白毛・大	中	地上部繁茂が少なく、草丈が低い。

z)は種～収穫までの日数

4 ソラマメ

(1)露地[10月中～11月上まき・5月中～5月下どり]

品 種 名	種 苗 会社名	特 性 一 覧						備 考
		早晩性	草 勢	収 量	豆の大きさ	1莢粒数	莢の色	
仁 徳 一 寸	タキイ	中早生	強	多	やや大	2～3粒	濃緑	本葉4～5枚程度で越冬。
打 越 一 寸	サカタ	中早生	強	多	やや大	3粒主体	濃緑	3粒莢多く、耐寒性あり。
三 連	タキイ	中早生	強	やや多	やや大	3粒	濃緑	3粒莢が多い。
打 越 緑 一 寸	サカタ	中早生	中	多	やや大	3粒主体	濃緑	3粒莢が多く、むき実の色が濃緑。

5 ラッカセイ

(1) 露地[5月上～6月上まき・9月下～10月中どり]

品 種 名 (育成者)	特 性 一 覧					備 考	
	早晩性	草型 ²⁾	主茎長	種子の 大きさ	収穫適期		
郷 の 香	千葉県	早生	立性	短	大粒	開花期後 約70日	ゆで豆用。耐肥性・晩播適応性がある。 煎り莢用。耐肥性・晩播適応性がある。 煎り莢用。極端な肥沃地は避ける。晩播適 応性は低い。
ナカテユタカ	千葉県	中生	立性	短	大粒	開花期後 約80日	
改 良 半 立	神奈川県	晩生	半立性	短	中粒	約95日	

2) 草型は、立性と伏性に分け、その中間が半立性。

Ⅶ い も 類

1 サツマイモ

(1) 早熟[3月伏込み・5月植え付け・8月～9月どり]

品 種 名	(育成者)	特 性 一 覧							備 考
		形 状	大 小	皮 色	肉 色	収 量	ほう芽性	ほう芽数	
高 系 1 4 号	-	紡錘	中	赤紫	黄白	中	良	少	早掘用、黒斑病、ネコブセンチュウに弱い。
ベ ニ ア ズ マ	作物研	長紡錘	中	濃赤紫	黄	多	良	中	早掘用、かいよう病に強い、つる割病にやや弱い。貯蔵性が悪い。

(2) 普通[3月伏込み・5月～6月植え付け・10月～11月どり]

品 種 名	(育成者)	特 性 一 覧							備 考
		形 状	大 小	皮 色	肉 色	収 量	ほう芽性	ほう芽数	
高 系 1 4 号	-	紡錘	中	赤紫	黄白	中	良	少	早掘用、黒斑病、ネコブセンチュウに弱い。
ベ ニ ア ズ マ	作物研	長紡錘	中	濃赤紫	黄	多	良	中	早掘用、かいよう病に強い、つる割れ病にやや弱い。貯蔵性が悪い。高温障害(形状悪い)。
ク リ マ サ リ	九州研	長紡錘	中	赤紫	黄白	多	中	中	早掘用。
ベ ニ コ マ チ	作物研	長紡錘	中	赤紫	黄	多	良	中	中～普通掘用。黒斑病に強いが、つる割れ病に弱い。
パ ー プ ル ス イ ー ト ロ ー ド	作物研	長紡錘	中	濃赤紫	紫	多	良	多	紫いもの中では良食味。 (PVP)
ベ に ま さ り	九州研	長紡錘	中	赤	黄	やや多	やや良	やや多	良食味。ネコブセンチュウにはやや弱い。 (PVP)
ベ に は る か	作物研	紡錘	中	赤紫	黄白	中	中	中	ヤニ(ヤラピン)が多く汚れやすい。貯蔵中に粘質になりやすい。 (PVP)
シルクスイート	カネコ	紡錘	中	濃赤紫	黄白	やや多	中	少	貯蔵中に粘質になりやすい。 (PVP)

2 ジャガイモ

(1) 春作[2月～3月植え付け・6月どり]

品 種 名	(育成者)	特 性 一 覧									備 考
		早晩性	休眠	収量	芽数	芽の深さ	皮色	形状	肉色	肉質 ²⁾	
インカのめざめ	北海道農試	極早生	短	少	少	浅	黄褐	卵	濃黄	やや粘	休眠期間が短いので茎葉の黄変後速やかに収穫する。
ワセシロ	北海道	極早生	中	多	中	中	黄白	扁球	白	粉	「男爵薯」より早生。ポテトチップに向く。
男爵薯	-	早生	長	中～多	中	深	黄白	球	白	やや粉	栽培適応性及び用途が広い。
キタアカリ	北海道農試	早生	やや短	多	中	中	黄白	扁球	黄	やや粉	ビタミンCが多く、サラダ向き。耐湿性があり、水田転作にも向く。シストセンチュウ抵抗性。
とうや	北海道農試	中早生	長	多	少	浅	黄褐	球	黄	やや粘	大いになりやすいので、多肥・疎植をさける。煮物に向く。シストセンチュウ抵抗性。
メークイン	-	中生	やや短	中	中	浅	黄白	長卵	淡黄	やや粘	2次成長による塊茎の形がくずれ易い、病害に弱い。
アンデス赤	-	中晩生	やや短	多	中	深	赤	球	黄	粉	秋作も可。

(2) 秋作[8月下～9月上植え付け・11月どり]

品 種 名	(育成者)	特 性 一 覧									備 考
		早晩性	休眠	収量	芽数	芽の深さ	皮色	形状	肉色	肉質 ²⁾	
普賢丸	長崎県	早生	短	多	多	浅	淡茶	球	淡黄	やや粉	春作秋作兼用の品種で、シストセンチュウ抵抗性。
デジマ	長崎県	晩生	短	多	中	浅	黄白	扁円～球	淡黄	やや粉	青枯病に弱い。
ニユタカ	長崎県	晩生	短	多	中	浅	黄白	扁円	淡黄	やや粘	そうか病に弱い。

2) 粉～やや粉～やや粘～粘

3 サトイモ

(1) 普通[4月中下植え付け・9月上～11月下どり]

品 種 名	種 苗 会社名	特 性 一 覧					備 考
		早晚性	芽の色	利用部	子芋の形	肉質 ²⁾	
石 川 早 生	-	早生	白	子芋・孫芋	丸	粘	肉質は粘質、マルチ栽培で9月上旬から収穫できる。
土 垂	-	中生	白	子芋・孫芋	やや長	中間	子芋の肥大が良好な多収品種。
弥 一	-	中生	白	子芋・孫芋	長	粘	蓮葉の代表品種。土壌の乾燥が激しいと芋の表面に割れ目が入りやすい。
じんのうそうけん 1 号 神 農 総 研	全農県本部	中生	白	子芋・孫芋	俵形	粘	肉質は緻密。乾燥にやや弱い。コガネムシ幼虫に被害されやすい。
大 吉 (セレバス)	-	中晩生	赤	親芋・子芋	長	中間	赤芽の良質品種。高温を好み、種芋は低温で腐敗しやすい。
海 老 芋 (唐 芋)	-	中晩生	白	親芋・子芋	長	中間	肉質は緻密。食味良い。芋茎も利用できる。収量はやや低い。
八 ツ 頭	-	晩	赤	親芋	長	粉	親芋を利用する。収量は低い。

2) 粉(ほくほく)～中間～粘(ねっとり)

VIII 工 芸 作 物

1 コンニャク

(1) 普通[4月下～5月上植え付け・10月中～12月上どり]

品 種 名	(育成者)	特 性 一 覧				備 考
		早晚性	球茎肥大性	生子の形状	粘度	
あかぎおおだま	群馬県	中生	高い	棒状	やや強	葉枯病・根腐病にやや強い。
は る な く ろ	群馬県	中生	やや高い	球状	やや弱	